

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Baar-Wutach

Regionale Einheit

5/01 Baar-Schwarzwald

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

854 (631 bis 1034) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

6,3 (5,5-6,8) Ø Temp. / Jahr [°C]


12,7 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

1175 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

486 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

pgSH-



blaßh'grün
d'rote Schräggitter
d'rote Querstrichelung
schwarze Pluszeichen

Tannen-Buchen-Kiefern-Wald auf podsoliertem mäßig trockenem grusigem Sommerhang

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Mäßig trocken, örtlich trocken

in der

Öko-Serie der lehmigen Grushänge

(Mindestes 40 cm lehmig-sandig-grusiger, örtlich auch stärker steiniger Hangschutt aus Granit und Gneis. Im Übergangsbereich zum Buntsandstein stärker sandig-lehmig; im Bereich der Haslach und der Wutach im Oberhangbereich Kiesüberlagerung bzw. -beimengung)


Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der steileren Hänge Hanglagen und -rücken, gelegentlich auch mäßig frisch; ausgeprägt lehmarm
	Bodentyp	Braunerde-Podsol bis Podsol, selten Podsol-Braunerde
	Humusform	Rohhumus
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	podsoliert (O/Ahe/Ae/B(h)s/...-Profil)
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Vaccinium myrtillus-, Bazzania trilobata-, Leucobryum glaucum-, Deschampsia flexuosa - Gruppe
	Aufnahmen	12 Vegetationsaufnahmen (2002 bis 2012)
	Natürliche Waldgesellschaft	Beerstrauch-Tannenwald; Beerstrauch-Tannenwald mit Kiefer und Weißmoos; Beerstrauch-Tannenwald mit Kiefer (typisch)
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Weißtanne, Rotbuche, Waldkiefer
	Nebenbaumart(en)	Gemeine Fichte
	Pionierbaumart(en)	Sandbirke (Hängebirke), Vogelbeere (Eberesche)

Baumarteneignung	Konkurrenzkraft Pflughchkeit Sicherheit Leistung					
	möglich (m)	Dgl	2	2	1	3
		Kie	1	3	1	2
		Ta	1	1	2	3
	wenig geeignet (w)	Fi	1	3	2	3
	ungeeignet (u)	BAh	3	2	3	3
	biologisch erwünscht (b)	RBu	2	1	1	3
	sonstige Laubbaumarten	SaBi, Vobe				
	sonstige Nadelbaumarten	-				

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	70,2 ha			
	Anteil der Standortseinheit innerhalb der Regionallegende	häufig (0,59 %)			
	Kartierzeitraum	2010-19	-	24,9 %	
		2000-09	-	75,1 %	

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_01_montan.pdf
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_01_montan.pdf
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_01_montan.pdf
	Zugehörige Kartierobjekte	9924, 10025, 9610

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de