

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Baar-Wutach

Regionale Einheit

5/01 Baar-Schwarzwald

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

854 (631 bis m. ü. NN
1034)

Klimadaten 1961-
1990 (regionalisiert)*


6,3 (5,5-6,8) Ø Temp. / Jahr [°C]
12,7 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

1175 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

486 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

sDL



Tannen-Buchen-Fichten-Wald auf stark saurem grundfrischem Decklehm

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

**Grundfrisch bis schwach
wechselfeucht**

h'braun
d'rote Querstrichelung

in der

Öko-Serie der mehr oder weniger vernässenden Decklehme

(Mindestens 50 bis 60 cm feinsandig-schluffiger Lehm mit wechselnd starken Staunässezeichen im Oberboden und mit marmoriertem Unterboden über schwer durchlässigem, z.T. steinigem Ton, i.d.R. Fließerde der Buntsandstein-Hochfläche)


Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der ebenen und schwach geneigten Lagen Flachlagen
	Bodentyp	pseudovergleyte Parabraunerde bis Pseudogley-Parabraunerde mit Übergängen zur Pseudogley-Braunerde, mehr oder weniger podsolig
	Humusform	Rohhumusartiger Moder bis Rohhumus, örtlich Übergänge zu Moder
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Vaccinium myrtillus-, Deschampsia flexuosa-, Bazzania trilobata-, (Luzula luzuloides-, Sphagnum) - Gruppe
	Aufnahmen	4 Vegetationsaufnahmen (2010)
	Natürliche Waldgesellschaft	Hainsimsen-Fichten-Tannenwald (typisch); Beerstrauch-Tannenwald mit Kiefer; Hainsimsen-Fichten-Tannenwald
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Weißtanne, Rotbuche, Gemeine Fichte
	Nebenbaumart(en)	Bergahorn, Waldkiefer
	Pionierbaumart(en)	Sandbirke (Hängebirke), Vogelbeere (Eberesche)

Baumarteneignung	Konkurrenzkraft Pfléglichkeit Sicherheit Leistung					
	geeignet (g)	Ta	1	1	1	1
	geeignet bis möglich (g/m)	Dgl	1	2	2	2
	möglich (m)	RBu	2	1	2	2
		Kie	2	3	1	2
	wenig geeignet (w)	Fi	1	3	2	1
		BAh	3	1	2	3
	sonstige Laubbaumarten	SaBi, Vobe				
	sonstige Nadelbaumarten	-				

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	28,4 ha				
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	gelegentlich/zerstreut (0,24 %)				
	Kartierzeitraum	2010-19	-	69,9 %		
		2000-09	-	30,1 %		

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_01_montan.pdf				
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_01_montan.pdf				
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_01_montan.pdf				
	Zugehörige Kartierobjekte	10025, 9953, 10003				

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de