

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Baar-Wutach

Regionale Einheit

5/01 Baar-Schwarzwald

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

854 (631 bis m. ü. NN
1034)

Klimadaten 1961-
1990 (regionalisiert)*

6,3 (5,5-6,8) Ø Temp. / Jahr [°C]

12,7 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


1175 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

486 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

sT

**Tannen-Buchen-Fichten-Wald auf stark saurem
mäßig frischem Ton**



oliv
d'rote Querstrichelung

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Mäßig frisch

in der

Öko-Serie der nicht oder wenig vernässenden Buntsandstein-Tone

(Rotbrauner, plastizierter, (kalkfreier,) schluffiger Ton, nach unten weniger plastiziert und zunehmend schiefrig oder bröselig, aus Verwitterung des Röts; lehmig-feinsandige Auflage bis 20 (25) cm möglich)


Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der ebenen und schwach geneigten Lagen teils schwach aufgewölbte, Flachlagen; oft Spuren früherer landwirtschaftlicher Bearbeitung
	Bodentyp	Braunerde-Pelosol bis Pelosol, ± podsoliert
	Humusform	Rohhumusartiger Moder bis Rohhumus
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Vaccinium myrtillus-, Deschampsia flexuosa-, Bazzania trilobata-, (Ajuga reptans-, Milium effusum-, Sphagnum) - Gruppe
	Aufnahmen	13 Vegetationsaufnahmen (2010 bis 2012)
	Natürliche Waldgesellschaft	Hainsimsen-Fichten-Tannenwald (typisch); Labkraut-Tannenwald; stellenweise Hainsimsen-Fichten-Tannenwald
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Weißtanne, Rotbuche, Gemeine Fichte
	Nebenbaumart(en)	
	Pionierbaumart(en)	Sandbirke (Hängebirke), Vogelbeere (Eberesche), Waldkiefer

Baumarteneignung	Konkurrenzkraft Pfléglichkeit Sicherheit Leistung					
	geeignet bis möglich (g/m)	Ta	1	2	1	2
	möglich (m)	Dgl	2	2	2	2
		Kie	2	2	1	2
		Fi	1	3	2	2
	möglich und biologisch erwünscht (mb)	RBu	2	1	2	3
	wenig geeignet (w)	BAh	2	1	2	3
	sonstige Laubbaumarten	StEi				
	sonstige Nadelbaumarten	-				

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	32,3 ha				
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	gelegentlich/zerstreut (0,27 %)				
	Kartierzeitraum	2010-19	-	19,7 %		
		2000-09	-	80,3 %		

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_01_montan.pdf
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_01_montan.pdf
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_01_montan.pdf
	Zugehörige Kartierobjekte	9610, 10025, 9953

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de