

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Baar-Wutach

Regionale Einheit

5/01 Baar-Schwarzwald

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

854 (631 bis 1034) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

6,3 (5,5-6,8) Ø Temp. / Jahr [°C]

12,7 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


1175 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

486 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

slSt

Tannen-Buchen-Wald auf saurem mäßig frischem lehmigem Steinschuttboden



h'grün

h'braune Senkrechtstrichelung

Standortskundliche Wasserhaushaltsstufe:

Mäßig frisch, örtlich mäßig trocken

in der

Öko-Serie der lehmigen Steinschuttböden

(Flach- bis mittelgründige, stark steinige, lehmig-sandig-grusige Böden; Steinschutt meist schon im Oberboden; Bohrgründigkeit meist weniger als 40 cm, mehr oder weniger eingengter Wurzelraum und oft eingeschränkte Wasserkapazität)


Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der ebenen und schwach geneigten Lagen Flachlagen und flache Kuppen
	Bodentyp	Braunerde und Ranker-Braunerde, podsolic bis podsoliert
	Humusform	Moder bis rohhumusartiger Moder, selten Rohhumus
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	stark podsolic (O-Aeh+Ae)
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Vaccinium myrtillus-, Deschampsia flexuosa-, Bazzania trilobata-, (Miliun effusum-, Ajuga reptans-, Urtica dioica) - Gruppe
	Aufnahmen	1 Vegetationsaufnahme (2010)
	Natürliche Waldgesellschaft	Hainsimsen-Fichten-Tannenwald (typisch); Hainsimsen-Fichten-Tannenwald
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Weißtanne, Rotbuche
	Nebenbaumart(en)	Gemeine Fichte, Waldkiefer
	Pionierbaumart(en)	Sandbirke (Hängebirke), Vogelbeere (Eberesche)

Baumarteneignung	Konkurrenzkraft Pfléglichkeit Sicherheit Leistung					
	geeignet (g)	Ta	2	1	2	2
	geeignet bis möglich (g/m)	Dgl	2	1	1	2
	möglich (m)	RBu	2	1	2	2
		Fi	1	3	2	2
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	BAh	3	1	1	2
		Kie	2	3	1	2
	sonstige Laubbaumarten	-				
	sonstige Nadelbaumarten	-				

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit 4,9 ha
	Anteil der Standortseinheit innerhalb der Regionallegende selten (0,04 %)
	Kartierzeitraum 2010-19 - 58,1 %
	2000-09 - 41,9 %

Organisatorisch	Link zur Regionallegende https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_01_montan.pdf
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_01_montan.pdf
	Link zur Vegetationsgruppierung https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_01_montan.pdf
	Zugehörige Kartierobjekte 10025, 9924, 9953

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de