

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Baar-Wutach

Regionale Einheit

5/01 Baar-Schwarzwald

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

854 (631 bis 1034) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

6,3 (5,5-6,8) Ø Temp. / Jahr [°C]

12,7 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


1175 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

486 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

slgSH

Tannen-Buchen-Wald auf saurem mäßig frischem lehmig-grusigem Sommerhang



blaßh'grün
h'braune Schräggitter
orange Querstrichelung

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Mäßig frisch, örtlich bis mäßig trocken

in der

Öko-Serie der lehmigen Grushänge

(Mindestes 40 cm lehmig-sandig-grusiger, örtlich auch stärker steiniger Hangschutt aus Granit und Gneis. Im Übergangsbereich zum Buntsandstein stärker sandig-lehmig; im Bereich der Haslach und der Wutach im Oberhangbereich Kiesüberlagerung bzw. -beimengung)


Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der steileren Hänge Hanglagen (meist Mittel- und Oberhänge)
	Bodentyp	mehr oder weniger podsolige Braunerde
	Humusform	Moder bis rohhumusartiger Moder, örtlich Rohhumus
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	mäßig podsolig (O-Ahe)
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Deschampsia flexuosa-, Vaccinium myrtillus-, Luzula luzuloides-, (Miliun effusum-, Bazzania trilobata) - Gruppe
	Aufnahmen	2 Vegetationsaufnahmen (2011 bis 2012)
	Natürliche Waldgesellschaft	Hainsimsen-Fichten-Tannenwald; Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Weißtanne, Rotbuche
	Nebenbaumart(en)	Gemeine Fichte
	Pionierbaumart(en)	Sandbirke (Hängebirke), Vogelbeere (Eberesche), Waldkiefer

Baumarteneignung	Konkurrenzkraft Pflughchkeit Sicherheit Leistung					
	geeignet (g)	Dgl	1	1	1	2
		RBu	1	1	1	2
	geeignet bis möglich (g/m)	Ta	1	1	2	2
	möglich (m)	Kie	2	3	1	2
		Fi	1	3	2	2
	wenig geeignet (w)	BAh	3	1	2	3
	sonstige Laubbaumarten	SaBi, Vobe				
	sonstige Nadelbaumarten	-				

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	64,6 ha
	Anteil der Standortseinheit innerhalb der Regionallegende	häufig (0,55 %)
	Kartierzeitraum	2010-19 - 20,4 %
		2000-09 - 79,6 %

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_01_montan.pdf
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_01_montan.pdf
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_01_montan.pdf
	Zugehörige Kartierobjekte	9610, 9924, 10025, 9953, 10003

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de