

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Baar-Wutach

Regionale Einheit

5/01 Baar-Schwarzwald

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

854 (631 bis m. ü. NN
1034)

Klimadaten 1961-
1990 (regionalisiert)*

6,3 (5,5-6,8) Ø Temp. / Jahr [°C]

12,7 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


1175 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

486 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

sslG

**Tannen-Buchen-Fichten-Wald auf stark saurem
mäßig frischem lehmigem Grusboden**



h'grün
d'rote Pluszeichen

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Mäßig frisch, örtlich mäßig trocken

in der

Öko-Serie der lehmigen Grusböden

(Mehr als 40 cm sandig-lehmig-grusiger Boden über z.T. steiniger Verwitterung aus Granit, Gneis und Porphyr (Granitporphyr und Quarzporphyr). Im Übergangsbereich zum Buntsandstein im Oberboden Sandbeimengung, im Unterboden meist stärker lehmig; im Übergangsbereich zu Schwarzwaldschottern und Konglomerat (smc2) örtlich kiesige und sandige Beimengung)


Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der ebenen und schwach geneigten Lagen Flachlagen und Flachrücken
	Bodentyp	podsolige Braunerde bis Podsol-Braunerde
	Humusform	Rohhumusartiger Moder bis Rohhumus
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	mäßig podsolig (O-Ahe)
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Vaccinium myrtillus-, Bazzania trilobata-, Deschampsia flexuosa-, (Sphagnum-, Leucobryum glaucum) - Gruppe
	Aufnahmen	15 Vegetationsaufnahmen (2003 bis 2012)
	Natürliche Waldgesellschaft	Hainsimsen-Fichten-Tannenwald (typisch); Beerstrauch-Tannenwald (typisch); Hainsimsen-Fichten-Tannenwald; stellenweise Beerstrauch-Tannenwald
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Weißtanne, Rotbuche, Gemeine Fichte
	Nebenbaumart(en)	
	Pionierbaumart(en)	Sandbirke (Hängebirke), Vogelbeere (Eberesche), Waldkiefer

Baumarteneignung	Konkurrenzkraft Pflughchkeit Sicherheit Leistung					
	geeignet (g)	Ta	1	1	1	2
	möglich (m)	Dgl	2	1	2	2
		Kie	2	3	1	1
		Fi	1	3	1	2
	biologisch erwünscht (b)	BAh	3	1	2	3
		RBu	3	1	1	3
	sonstige Laubbaumarten	SaBi, Vobe				
	sonstige Nadelbaumarten	-				

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	99,8 ha				
	Anteil der Standortseinheit innerhalb der Regionallegende	häufig (0,84 %)				
	Kartierzeitraum	2010-19	-	59,4 %		
		2000-09	-	40,6 %		

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_01_montan.pdf				
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_01_montan.pdf				
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_01_montan.pdf				
	Zugehörige Kartierobjekte	10025, 9924, 9610, 9953				

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de