

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Baar-Wutach

Regionale Einheit

5/01 Baar-Schwarzwald

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

854 (631 bis 1034) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

6,3 (5,5-6,8) Ø Temp. / Jahr [°C]

12,7 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


1175 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

486 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

sslSt

Tannen-Buchen-Fichten-Wald auf stark saurem mäßig frischem lehmigem Steinschuttboden



h'grün
schwarze Senkrechtstrichelung
d'rote Pluszeichen

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Mäßig frisch bis mäßig trocken

in der

Öko-Serie der lehmigen Steinschuttböden

(Flach- bis mittelgründige, stark steinige, lehmig-sandig-grusige Böden; Steinschutt meist schon im Oberboden; Bohrgründigkeit meist weniger als 40 cm, mehr oder weniger eingegengter Wurzelraum und oft eingeschränkte Wasserkapazität)


Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der ebenen und schwach geneigten Lagen Flachlagen und breite Rücken
	Bodentyp	podsolige Braunerde (und Ranker-Braunerde) bis Podsol-Braunerde
	Humusform	Rohhumusartiger Moder bis Rohhumus
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	mäßig podsolig (O-Ahe)
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Vaccinium myrtillus-, Bazzania trilobata-, Deschampsia flexuosa-, (Sphagnum-, Leucobryum glaucum) - Gruppe
	Aufnahmen	1 Vegetationsaufnahme (2010)
	Natürliche Waldgesellschaft	Beerstrauch-Tannenwald mit Kiefer; Hainsimsen-Fichten-Tannenwald; stellenweise Beerstrauch-Tannenwald (typisch); stellenweise Hainsimsen-Fichten-Tannenwald (typisch)
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Weißtanne, Rotbuche, Gemeine Fichte
	Nebenbaumart(en)	Waldkiefer
	Pionierbaumart(en)	Sandbirke (Hängebirke), Vogelbeere (Eberesche)

Baumarteneignung		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
	möglich (m)	Dgl	2	1	2	2
		Kie	2	3	1	1
		Ta	2	1	2	2
		Fi	1	3	2	2
	wenig- bis ungeeignet (w/u)	BAh	3	1	2	3
	biologisch erwünscht (b)	RBu	3	1	2	3
	sonstige Laubbaumarten	SaBi, Vobe				
	sonstige Nadelbaumarten	-				

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	9,3 ha			
	Anteil der Standortseinheit innerhalb der Regionallegende	selten (0,08 %)			
	Kartierzeitraum	2010-19	-	15,7 %	
		2000-09	-	84,3 %	

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_01_montan.pdf
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_01_montan.pdf
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_01_montan.pdf
	Zugehörige Kartierobjekte	9924, 10025

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de