

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Baar-Wutach

Regionale Einheit

5/01 Baar-Schwarzwald

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

854 (631 bis 1034) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

6,3 (5,5-6,8) Ø Temp. / Jahr [°C]

12,7 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


1175 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

486 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

swfDL

Tannen-Fichten-Kiefern-Wald auf stark saurem wechselfeuchtem Decklehm



Standortskundliche Wasserhaushaltsstufe:

Wechselfeucht, örtlich stark wechselfeucht

h'braun
d'rote Querstrichelung
schwarze Wellenlinien

in der

Öko-Serie der mehr oder weniger vernässenden Decklehme

(Mindestens 50 bis 60 cm feinsandig-schluffiger Lehm mit wechselnd starken Staunässezeichen im Oberboden und mit marmoriertem Unterboden über schwer durchlässigem, z.T. steinigem Ton, i.d.R. Fließerde der Buntsandstein-Hochfläche)


Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der ebenen und schwach geneigten Lagen Flachlagen
	Bodentyp	Parabraunerde-Pseudogley bis Pseudogley, örtlich mit Übergängen zum Stagnogley, mehr oder weniger podsolig
	Humusform	Rohhumusartiger Moder bis Rohhumus
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Vaccinium myrtillus-, Bazzania trilobata-, Deschampsia flexuosa-, (Sphagnum-, Molinia) - Gruppe
	Aufnahmen	5 Vegetationsaufnahmen (2010)
	Natürliche Waldgesellschaft	Beerstrauch-Tannenwald mit Kiefer (typisch); stellenweise Beerstrauch-Tannenwald mit Kiefer
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Weißtanne, Waldkiefer, Gemeine Fichte
	Nebenbaumart(en)	Rotbuche
	Pionierbaumart(en)	Aspe (Zitterpappel), Sandbirke (Hängebirke), Vogelbeere (Eberesche)

Baumarteneignung	Konkurrenzkraft Pflughchkeit Sicherheit Leistung					
	geeignet (g)	Ta	1	1	1	2
	möglich (m)	Kie	2	3	1	2
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	Fi	1	3	3	2
	wenig geeignet (w)	Dgl	2	2	3	2
		RBu	3	2	3	2
	ungeeignet (u)	BAh	3	2	3	3
	sonstige Laubbaumarten	SaBi, Vobe				
	sonstige Nadelbaumarten	-				

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	5,1 ha
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	selten (0,04 %)
	Kartierzeitraum	2010-19 - 86,7 %
		2000-09 - 13,3 %

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_01_montan.pdf
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_01_montan.pdf
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_01_montan.pdf
	Zugehörige Kartierobjekte	10025, 9953

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de