

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Baar-Wutach

Regionale Einheit

5/01 Baar-Schwarzwald

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

854 (631 bis 1034) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

6,3 (5,5-6,8) Ø Temp. / Jahr [°C]

12,7 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


1175 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

486 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

vnSB

Tannen-Fichten-Wald auf vernässendem lehmig-sandigem Boden



orange

schwarze Wellenlinien doppelt

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Vernässend

in der

Gruppe der mehr oder weniger vernässenden lehmig-sandigen Böden

(Mindestens 30 cm lehmiger Sand bis sandiger Lehm mit unterschiedlich ausgeprägten Stauässezeichen über schwer durchlässiger toniger Buntsandstein-Verwitterung in unterschiedlicher Tiefe; im Oberboden wechselnder Steingehalt)


Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der ebenen und schwach geneigten Lagen Flachlagen und flachmuldige Verebnungen, meist am Rande von wasserzügigen Missen oder flachen Muldenzügen; teils frühere Landwirtschaft
	Bodentyp	Pseudogley bis Stagnogley
	Humusform	Moder bis Feuchtmoder
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Deschampsia flexuosa-, Vaccinium myrtillus-, Ajuga reptans-, (Miliun effusum-, Luzula luzuloides-, Bazzania trilobata-, Molinia-, Stachys sylvatica) - Gruppe
	Aufnahmen	9 Vegetationsaufnahmen (2003 bis 2012)
	Natürliche Waldgesellschaft	Beerstrauch-Tannenwald mit Kiefer (typisch); stellenweise Beerstrauch-Tannenwald mit Kiefer
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Weißtanne, Gemeine Fichte
	Nebenbaumart(en)	Waldkiefer
	Pionierbaumart(en)	Aspe (Zitterpappel), Moorbirke, Vogelbeere (Eberesche)

Baumarteneignung	Konkurrenzkraft Pflughchkeit Sicherheit Leistung					
	geeignet bis möglich (g/m)	Ta	1	2	2	2
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	Kie	2	3	2	2
		Fi	1	3	3	2
	wenig geeignet (w)	Dgl	2	2	3	2
	ungeeignet (u)	BAh	3	2	3	3
		RBu	3	2	3	3
	sonstige Laubbaumarten	Vobe				
	sonstige Nadelbaumarten	-				

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	235,3 ha				
	Anteil der Standortseinheit innerhalb der Regionallegende	häufig (1,99 %)				
	Kartierzeitraum	2010-19	-	47,6 %		
		2000-09	-	52,4 %		

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_01_montan.pdf				
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_01_montan.pdf				
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_01_montan.pdf				
	Zugehörige Kartierobjekte	9610, 10025, 9953, 10003				

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de