

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Baar-Wutach

Regionale Einheit

5/01 Baar-Schwarzwald

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

854 (631 bis 1034) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

6,3 (5,5-6,8) Ø Temp. / Jahr [°C]


12,7 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

1175 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

486 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

wzMi



bläuviolett

d'grüne Senkrechtstriche doppelt einfarbig

Fichten-Tannen-Wald auf wasserzügiger Misse

Standortskundliche Wasserhaushaltsstufe:

Grundfeucht bis wechselfeucht, örtlich auch stark wechselfeucht

in der

Gruppe der Missen

(Gebliche, sandige bis lehmig-sandige, staunasse und quellig-nasse Verwitterungsdecken des Buntsandsteins mit stauendem, tonigem Unterboden, mit bestimmenden feuchten Rohhumus- und torfigen Feuchthumusauflagen zwischen 10 und 30 cm)


Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der ebenen und schwach geneigten Lagen wasserzügige Muldenformen, Hochflächen und stärker geneigte Flachlagen, z.T. künstlich entwässert
	Bodentyp	Gley-Pseudogley und Pseudogley (bis Stagnogley)
	Humusform	Rohhumus bis Feuchtrohumus, z.T. in Zersetzung
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Vaccinium myrtillus-, Deschampsia flexuosa-, Bazzania trilobata-, Sphagnum-, (Ajuga reptans-, Milium effusum-, Urtica dioica-, Stachys sylvatica) - Gruppe
	Aufnahmen	35 Vegetationsaufnahmen (2002 bis 2012)
	Natürliche Waldgesellschaft	Beerstrauch-Tannenwald mit Kiefer (typisch); stellenweise Beerstrauch-Tannenwald mit Kiefer
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Gemeine Fichte, Weißtanne
	Nebenbaumart(en)	Waldkiefer
	Pionierbaumart(en)	Aspe (Zitterpappel), Moorbirke, Vogelbeere (Eberesche)

Baumarteneignung	Konkurrenzkraft Pflughchkeit Sicherheit Leistung					
	geeignet bis mglich (g/m)	Ta	1	2	2	1
		Fi	1	2	3	1
	wenig geeignet (w)	Kie	3	2	2	2
	ungeeignet (u)	Dgl	3	2	3	3
		BAh	3	2	3	3
		RBu	3	2	3	3
	sonstige Laubbaumarten	MoBi, Vobe				
	sonstige Nadelbaumarten	-				

Vorkommen	Flche der Standortseinheit	355,5 ha			
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	besonders hufig (3 %)			
	Kartierzeitraum	2010-19	-	24,5 %	
		2000-09	-	57,6 %	
		1990-99	-	2,7 %	
		1980-89	-	0,8 %	
		1970-79	-	14,3 %	

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_01_montan.pdf
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_01_montan.pdf
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_01_montan.pdf
	Zugehrige Kartierobjekte	9610, 10025, 7715 (Mi+), 9953, 9004 (Mi+), 10003, 8405 (Mi+), 7805 (Mi+)

Impressum

 Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de