

**Waldstandorte  
Baden-  
Württemberg**

**Wuchsgebiet**

Baar-Wutach

**Regionale Einheit**

5/02 Baar

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

743 (602 bis 904) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)\*

6,8 (6,3-7,1) Ø Temp. / Jahr [°C]

13,4 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


915 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

425 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

\* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

**KMB-**

**Buchen-Tannen-Wald auf mäßig trockenem Keuper-Mischboden**



Standortskundliche Wasserhaushaltsstufe:

**Mäßig trocken, auch trocken bis wechsell trocken**

h'grün  
orange Querstrichelung  
schwarze Sandpunkte

in der

**Öko-Serie der nicht oder wenig vernässenden Keuper-Mischböden**

(Mischböden im Bereich des Mittleren Keupers: oft 20 bis 60, im Mittel 30 cm Mittel- bis Grobsand bis lehmiger Sand über (sandigem) Ton, z.T. örtlich bis zur Oberfläche, oder Ton über Sand, wechselhaft durch Fließerdebildungen)


<b>Morphologie und Boden</b>	<b>Morphologische Beschreibung</b>	Standortseinheiten der ebenen und schwach geneigten Lagen Flachlagen und Rücken
	<b>Bodentyp</b>	podsolige Braunerde
	<b>Humusform</b>	Mullmoder bis Moder
	<b>Basenausstattung</b>	keine Eingabe
	<b>Podsoligkeit</b>	mäßig podsolig (O-Ahe)
	<b>Rutschgefährdung</b>	Keine Rutschgefährdung
<b>Vegetation</b>	<b>Ökologische Artengruppen</b>	Milium effusum-, Asarum europaeum-, Deschampsia flexuosa-, Luzula luzuloides-, Pleurozium schreberi-, (Ajuga reptans-, Bromus erectus-, Mercurialis perennis) - Gruppe
	<b>Aufnahmen</b>	3 Vegetationsaufnahmen (2001 bis 2003)
	<b>Natürliche Waldgesellschaft</b>	Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne; Waldmeister-Buchenwald mit Tanne
<b>Baumarten des Standortswald</b>	<b>Hauptbaumart(en)</b>	Rotbuche, Weißtanne
	<b>Nebenbaumart(en)</b>	Stieleiche
	<b>Pionierbaumart(en)</b>	Sandbirke (Hängebirke), Vogelbeere (Eberesche), Waldkiefer

Baumarteneignung		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
	möglich (m)	StEi	2	1	1	3
		Kie	2	3	1	2
	möglich und biologisch erwünscht (mb)	RBu	1	2	1	3
		Ta	1	2	2	3
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	Dgl	2	2	2	3
	wenig geeignet (w)	Es	3	1	2	3
		BAh	3	1	2	3
	wenig- bis ungeeignet (w/u)	Fi	2	3	3	3
	sonstige Laubbaumarten	-				
	sonstige Nadelbaumarten	-				

Vorkommen	<b>Fläche der Standortseinheit</b>	4,9 ha
	<b>Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende</b>	selten (0,07 %)
	<b>Kartierzeitraum</b>	2010-19 - 51,3 %
		2000-09 - 48,7 %

Organisatorisch	<b>Link zur Regionallegende</b>	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_02_montan.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_02_montan.pdf</a>
	<b>Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung</b>	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_02_montan.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_02_montan.pdf</a>
	<b>Link zur Vegetationsgruppierung</b>	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_02_montan.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_02_montan.pdf</a>
	<b>Zugehörige Kartierobjekte</b>	10003, 9610

**Impressum**



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg  
 Abt. Waldnaturschutz  
 Wonnhaldestr. 4  
 79100 Freiburg  
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

**Datenquelle:**

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

**Technische Realisierung:**

IDaMa GmbH, Freiburg [www.idama.de](http://www.idama.de)