

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Baar-Wutach

Regionale Einheit

5/02 Baar

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

743 (602 bis 904) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

6,8 (6,3-7,1) Ø Temp. / Jahr [°C]

13,4 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


915 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

425 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

KMB

Buchen-Tannen-Wald auf mäßig frischem Keuper-Mischboden



Standortskundliche Wasserhaushaltsstufe:

Mäßig frisch bis grundfrisch, örtlich bis schwach wechselfeucht

h'grün
h'grüne Querstrichelung
schwarze Sandpunkte

in der

Öko-Serie der nicht oder wenig vernässenden Keuper-Mischböden

(Mischböden im Bereich des Mittleren Keupers: oft 20 bis 60, im Mittel 30 cm Mittel- bis Grobsand bis lehmiger Sand über (sandigem) Ton, z.T. örtlich bis zur Oberfläche, oder Ton über Sand, wechselhaft durch Fließerdebildungen)


Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der ebenen und schwach geneigten Lagen Flachlagen
	Bodentyp	(mehrschichtige) Braunerde, zum Teil schwach podsolig oder pseudovergleyt
	Humusform	Mull bis Mullmoder
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	stellenweise schwach podsolig (O-Aeh)
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Milium effusum-, Ajuga reptans-, Asarum europaeum-, Urtica dioica-, Deschampsia flexuosa-, Melampyrum sylvaticum-, (Stachys sylvatica-, Luzula luzuloides) - Gruppe
	Aufnahmen	6 Vegetationsaufnahmen (2001 bis 2007)
	Natürliche Waldgesellschaft	Waldmeister-Buchenwald mit Tanne; Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche, Weißtanne
	Nebenbaumart(en)	Bergahorn, Gemeine Esche, Gemeine Fichte
	Pionierbaumart(en)	Salweide, Sandbirke (Hängebirke), Stieleiche, Traubeneiche, Vogelbeere (Eberesche), Vogelkirsche

Baumarteneignung	Konkurrenzkraft Pflughchkeit Sicherheit Leistung					
	geeignet bis möglich (g/m)	Dgl	1	2	2	2
		Es	2	2	1	2
		RBu	1	2	1	2
		Ta	1	2	1	2
	möglich (m)	BAh	2	2	2	2
		StEi	3	1	1	2
		Fi	1	3	2	2
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	Kie	3	2	1	2
	sonstige Laubbaumarten	-				
	sonstige Nadelbaumarten	-				

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	61,4 ha				
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	häufig (0,94 %)				
	Kartierzeitraum	2010-19	-	53,4 %		
		2000-09	-	16,8 %		
		1970-79	-	29,8 %		

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_02_montan.pdf
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_02_montan.pdf
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_02_montan.pdf
	Zugehörige Kartierobjekte	10003, 7815 (KMB+), 9610, 7907 (KMB+)

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de