

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Baar-Wutach

Regionale Einheit

5/02 Baar

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

743 (602 bis 904) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

6,8 (6,3-7,1) Ø Temp. / Jahr [°C]

13,4 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


915 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

425 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

LKM

Buchen-Tannen-Wald auf mäßig frischem Lettenkeuper-Mischlehm



Standortskundliche Wasserhaushaltsstufe:

Mäßig frisch und grundfrisch, örtlich bis frisch, teils auch schwach wechselfeucht

h'grün
d'braune Punkte

in der


Öko-Serie der nicht oder wenig vernässenden Lettenkeuper-Mischlehme

(I.d.R. zwei- oder mehrschichtige, bodenartlich wechselhafte (durchmischte) Böden aus Fließerden des Lettenkeupers und pleistozänem Lösslehm: 25 bis 60 cm (häufig nur 40 cm) gelblicher, ± kleinsteiniger, sandiger Lehm bis Schlufflehm (Feinlehm) über steinhaltigem, feinsandigem Ton bis tonigem Lehm der Lettenkeuper-Verwitterung in Form von Fließerden; an der Grenze zum Ton Staunässeanzeichen möglich)

Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der ebenen und schwach geneigten Lagen Flachlagen
	Bodentyp	Parabraunerde bis Pseudogley-Parabraunerde
	Humusform	Mull bis Mullmoder
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Milium effusum-, Urtica dioica-, Asarum europaeum-, Ajuga reptans-, (Stachys sylvatica-, Juncus-, Luzula luzuloides) - Gruppe
	Aufnahmen	10 Vegetationsaufnahmen (2001 bis 2007)
	Natürliche Waldgesellschaft	Waldmeister-Buchenwald mit Tanne
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche, Weißtanne
	Nebenbaumart(en)	Bergahorn, Gemeine Esche
	Pionierbaumart(en)	Salweide, Sandbirke (Hängebirke), Stieleiche, Vogelbeere (Eberesche), Vogelkirsche

		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung
Baumarteneignung	geeignet (g)	Ta	1	1	1
	geeignet bis möglich (g/m)	Dgl	1	2	2
		RBu	1	2	1
	möglich (m)	Es	2	2	1
		BAh	2	2	2
		StEi	3	1	1
		Fi	1	3	2
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	Kie	3	2	1
	sonstige Laubbaumarten	VKir			
	sonstige Nadelbaumarten	ELä			
Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	52,5 ha			
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	häufig (0,81 %)			
	Kartierzeitraum	2010-19 - 55,4 %			
		2000-09 - 44,6 %			
Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_02_montan.pdf			
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_02_montan.pdf			
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_02_montan.pdf			
	Zugehörige Kartierobjekte	10003, 9610, 9619, 10025			

Impressum

 Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de