

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Baar-Wutach

Regionale Einheit

5/02 Baar

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

743 (602 bis 904) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

6,8 (6,3-7,1) Ø Temp. / Jahr [°C]

13,4 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


915 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

425 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

MeH-

Buchenwald auf mäßig trockenem Mergelhang



oliv
d'gelbe Schräggitter
d'gelbe Punkte

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Mäßig trocken

in der

Öko-Serie der Mergelhänge und Mergeltonhänge

(Flachere und steilere Hänge im Unteren und Mittleren Muschelkalk; lehmig-tonige Verwitterung mit einer maximalen Plastizierungs- und Entkalkungstiefe von 40 cm über mehr oder weniger durchlässigen, teils steinigen, teils bröseligen, stets dolomitischen Mergeln)


Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der Hänge Hänge
	Bodentyp	Mergelrendzina, selten Rendzina-Pelosol
	Humusform	Mull bis Moder
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Asarum europaeum-, Urtica dioica-, Carex montana-, Milium effusum-, Bromus erectus-, Carex flacca-, Deschampsia flexuosa-, (Mercurialis perennis-, Pleurozium schreberi-, Melampyrum sylvaticum-, Luzula luzuloides-, Tanacetum corymbosum) - Gruppe
	Aufnahmen	keine Vegetationsaufnahmen
	Natürliche Waldgesellschaft	Seggen-Buchenwald; stellenweise Waldgersten-Buchenwald mit Tanne
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche
	Nebenbaumart(en)	Bergahorn, Eibe, Feldahorn, Gemeine Esche, Sommerlinde, Spitzahorn, Stieleiche, Traubeneiche, Weißtanne
	Pionierbaumart(en)	Mehlbeere, Sandbirke (Hängebirke), Vogelbeere (Eberesche), Vogelkirsche, Waldkiefer

Baumarteneignung	Konkurrenzkraft Pflughlichkeit Sicherheit Leistung					
	möglich (m)	StEi	1	2	1	3
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	Es	1	2	2	3
	wenig geeignet (w)	BAh	2	2	2	3
		Kie	2	3	3	2
	wenig- bis ungeeignet (w/u)	Ta	2	2	3	3
	ungeeignet (u)	Dgl	2	2	3	3
		Fi	2	2	3	3
	biologisch erwünscht (b)	RBu	2	2	2	3
	sonstige Laubbaumarten	FAh, MeBe				
	sonstige Nadelbaumarten	-				

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	6,1 ha
	Anteil der Standortseinheit innerhalb der Regionallegende	selten (0,09 %)
	Kartierzeitraum	2010-19 - 29,1 %
		2000-09 - 70,9 %

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_02_montan.pdf
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_02_montan.pdf
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_02_montan.pdf
	Zugehörige Kartierobjekte	9610, 10003

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de