

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Baar-Wutach

Regionale Einheit

5/02 Baar

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

743 (602 bis 904) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

6,8 (6,3-7,1) Ø Temp. / Jahr [°C]

13,4 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


915 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

425 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

SH-

Buchen-Tannen-Wald auf mäßig trockenem Sandhang



h'grün
orange Schräggitter
schwarze Sandpunkte

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Mäßig trocken

in der

Öko-Serie der Sandhänge

(20 bis 40 cm, im Durchschnitt 35 cm mächtige, ± podsolige Mittel- bis Grobsande des Stubensandsteins über - oft sandigen - Tonen der Bunten Mergel ; im Unterboden häufig sandig-tonige Fließerden; z.T. leicht kalkig, seltener Hangschutt und Verwitterung des Schilfsandsteins)


Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der Hänge meist sonnseitige Hänge
	Bodentyp	podsolige Braunerde, meist zweischichtig
	Humusform	Mullmoder bis Moder
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	mäßig podsolig (O-Ahe)
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Milium effusum-, Luzula luzuloides-, Asarum europaeum-, Deschampsia flexuosa-, Pleurozium schreberi-, (Ajuga reptans-, Bromus erectus-, Mercurialis perennis) - Gruppe
	Aufnahmen	keine Vegetationsaufnahmen
	Natürliche Waldgesellschaft	Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche, Weißtanne
	Nebenbaumart(en)	Stieleiche
	Pionierbaumart(en)	Sandbirke (Hängebirke), Vogelbeere (Eberesche), Waldkiefer

Baumarteneignung		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
	geeignet (g)	Kie	1	3	1	1
	geeignet bis möglich (g/m)	Dgl	1	2	1	2
	möglich (m)	RBu	1	2	1	3
		StEi	2	2	1	3
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	Ta	1	2	2	3
	wenig geeignet (w)	Fi	1	3	2	3
	wenig- bis ungeeignet (w/u)	Es	3	2	2	3
		BAh	2	2	3	3
	sonstige Laubbaumarten	SaBi, Vobe				
sonstige Nadelbaumarten	-					

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	1,9 ha
	Anteil der Standortseinheit innerhalb der Regionallegende	sehr selten (0,03 %)
	Kartierzeitraum	2010-19 - 100 %

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_02_montan.pdf
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_02_montan.pdf
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_02_montan.pdf
	Zugehörige Kartierobjekte	10003

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de