

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Baar-Wutach

Regionale Einheit

5/02 Baar

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

743 (602 bis 904) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

6,8 (6,3-7,1) Ø Temp. / Jahr [°C]

13,4 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


915 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

425 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

SH

Buchen-Tannen-Wald auf mäßig frischem Sandhang



h'grün

h'grüne Schräggitter

schwarze Sandpunkte

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Mäßig frisch (bis hangfrisch)

in der

Öko-Serie der Sandhänge

(20 bis 40 cm, im Durchschnitt 35 cm mächtige, ± podsolige Mittel- bis Grobsande des Stubensandsteins über - oft sandigen - Tonen der Bunten Mergel ; im Unterboden häufig sandig-tonige Fließerden; z.T. leicht kalkig, seltener Hangschutt und Verwitterung des Schilfsandsteins)


Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der Hänge Hänge verschiedener Neigungsrichtung, häufig Nordhänge
	Bodentyp	podsolige Braunerde, auch Pelosol-Braunerde
	Humusform	Mull bis Moder
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	mäßig podsolig (O-Ahe)
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Milium effusum-, Luzula luzuloides-, Ajuga reptans-, Deschampsia flexuosa-, Urtica dioica-, Pleurozium schreberi - Gruppe
	Aufnahmen	1 Vegetationsaufnahme (2007)
	Natürliche Waldgesellschaft	Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne; Waldmeister-Buchenwald mit Tanne
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche, Weißtanne
	Nebenbaumart(en)	Bergahorn, Gemeine Fichte
	Pionierbaumart(en)	Salweide, Sandbirke (Hängebirke), Stieleiche, Vogelbeere (Eberesche), Vogelkirsche, Waldkiefer

Baumarteneignung		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
	geeignet (g)	Ta	1	2	1	2
	geeignet bis möglich (g/m)	Dgl	1	2	2	2
		RBu	1	2	1	2
	möglich (m)	BAh	2	2	2	2
		Kie	2	3	1	2
		Fi	1	3	1	2
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	Es	2	2	2	2
		StEi	3	2	1	2
	sonstige Laubbaumarten	REi				
sonstige Nadelbaumarten	ELä					

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	22,3 ha
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	gelegentlich/zerstreut (0,34 %)
	Kartierzeitraum	2010-19 - 49,3 %
		2000-09 - 35,3 %
		1970-79 - 15,3 %

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_02_montan.pdf
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_02_montan.pdf
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_02_montan.pdf
	Zugehörige Kartierobjekte	10003, 9610, 7815

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de