

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Baar-Wutach

Regionale Einheit

5/02 Baar

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

743 (602 bis 904) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

6,8 (6,3-7,1) Ø Temp. / Jahr [°C]

13,4 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


915 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

425 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

TL+

Buchen-Tannen-Bergahorn-Wald auf frischem Tonlehm



h'grün
d'grüne Punkte

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Frisch

in der

Öko-Serie der nicht oder wenig vernässenden Tonlehme

(Mindestens (30) 40 cm, auch bis 60 cm, meist steinärmer bis steinfreier, ± toniger, schluffiger Lehm, im Oberboden bis 30 cm oft feinsandig-schluffig, über plastiziertem, meist schluffigem Ton aus Verwitterung von Tonstein- und Tonmergel-Schichten des Braunjuras und des Unteren Muschelkalks, charakteristisch allmählicher, örtlich schwach pseudovergleyter, Übergang zum Zähton; in der Regel tiefreichend (mehr als 40/50 cm) entkalkt)


Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der ebenen und schwach geneigten Lagen breite Muldenlagen
	Bodentyp	Parabraunerde und Braunerde, zum Teil schwach pseudovergleyt, auch Pelosol-Braunerde
	Humusform	Mull
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Ajuga reptans-, Miliium effusum-, Asarum europaeum-, Stachys sylvatica-, Urtica dioica-, (Mercurialis perennis-, Impatiens noli-tangere-, Carex flacca) - Gruppe
	Aufnahmen	2 Vegetationsaufnahmen (2007 bis 2008)
	Natürliche Waldgesellschaft	Waldgersten-Buchenwald mit Tanne und Hexenkraut; Waldmeister-Buchenwald mit Tanne und Hexenkraut
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche, Weißtanne, Bergahorn
	Nebenbaumart(en)	Gemeine Esche
	Pionierbaumart(en)	Aspe (Zitterpappel), Vogelbeere (Eberesche)

Baumarteneignung			Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung
	geeignet (g)	BAh	1	2	1	1
		RBu	1	2	1	1
		Ta	1	2	1	1
	geeignet bis möglich (g/m)	Es	1	2	2	1
	möglich (m)	Dgl	2	2	2	1
		Fi	2	2	2	1
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	StEi	3	2	1	2
	wenig- bis ungeeignet (w/u)	Kie	3	2	2	3
	sonstige Laubbaumarten	VKir				
sonstige Nadelbaumarten	-					

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	50,4 ha				
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	häufig (0,77 %)				
	Kartierzeitraum	2010-19	-	40,7 %		
		2000-09	-	4,4 %		
		1970-79	-	54,9 %		

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_02_montan.pdf
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_02_montan.pdf
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_02_montan.pdf
	Zugehörige Kartierobjekte	7610, 10003, 7907, 9928

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de