

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Baar-Wutach

Regionale Einheit

5/02 Baar

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

743 (602 bis 904) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

6,8 (6,3-7,1) Ø Temp. / Jahr [°C]

13,4 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


915 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

425 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

TLH

**Buchen-Tannen-Wald auf mäßig frischem
Tonlehmhang**



h'grün
h'grüne Schräggitter

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Mäßig frisch

in der

Öko-Serie der Tonlehmhänge


(Meist flachere Hänge mit mehr als 35/60 cm mächtigen Verwitterungsdecken im Bereich des Braunjura, seltener im Lias-/Keuper-Grenzbereich, aus ± tonigem Lehm mit wechselndem Steingehalt, oberflächlich feinsandig-schluffig bis durchschnittlich 30 cm; nach unten allmählicher Übergang vom Lehm zum Zähton im Unterboden; stellenweise auch Fließerden)

Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der Hänge Schatthanglagen, vor allem Unterhänge, auch sonnseitige Hangmulden
	Bodentyp	Braunerde und Parabraunerde (über Pelosol)
	Humusform	Mull
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	latente Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Ajuga reptans-, Milium effusum-, Urtica dioica-, Asarum europaeum-, Stachys sylvatica-, (Mercurialis perennis-, Luzula luzuloides-, Carex flacca-, Melampyrum sylvaticum) - Gruppe
	Aufnahmen	25 Vegetationsaufnahmen (2001 bis 2008)
	Natürliche Waldgesellschaft	Waldmeister-Buchenwald mit Tanne; Waldgersten-Buchenwald mit Tanne
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche, Weißtanne
	Nebenbaumart(en)	Bergahorn, Gemeine Esche
	Pionierbaumart(en)	Salweide, Sandbirke (Hängebirke), Stieleiche, Vogelbeere (Eberesche), Vogelkirsche

Baumarteneignung		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
	geeignet (g)	RBu	1	2	1	1
		Ta	1	2	1	2
	geeignet bis möglich (g/m)	Dgl	1	2	2	2
	möglich (m)	Es	2	2	1	2
		BAh	2	2	1	2
		Fi	2	2	2	2
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	StEi	3	2	1	2
		Kie	3	2	1	2
	sonstige Laubbaumarten	VKir				
	sonstige Nadelbaumarten	ELä				

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	270,3 ha
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	besonders häufig (4,15 %)
	Kartierzeitraum	2010-19 - 36,5 %
		2000-09 - 17,5 %
		1970-79 - 46 %

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_02_montan.pdf
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_02_montan.pdf
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_02_montan.pdf
	Zugehörige Kartierobjekte	7610, 10003, 9928, 9610, 10025

Impressum


Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

 IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de