

**Waldstandorte  
Baden-  
Württemberg**

**Wuchsgebiet**

Baar-Wutach

**Regionale Einheit**

5/02 Baar

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

743 (602 bis 904) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)\*

6,8 (6,3-7,1) Ø Temp. / Jahr [°C]

13,4 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


915 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

425 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

\* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

**TL**

**Buchen-Tannen-Wald auf mäßig frischem Tonlehm**



h'grün  
h'grüne Punkte

Standortskundliche  
Wasserhaushaltsstufe:

**Mäßig frisch**

in der

**Öko-Serie der nicht oder wenig vernässenden Tonlehme**


(Mindestens (30) 40 cm, auch bis 60 cm, meist steinarmer bis steinfreier, ± toniger, schluffiger Lehm, im Oberboden bis 30 cm oft feinsandig-schluffig, über plastiziertem, meist schluffigem Ton aus Verwitterung von Tonstein- und Tonmergel-Schichten des Braunjuras und des Unteren Muschelkalks, charakteristisch allmählicher, örtlich schwach pseudovergleyter, Übergang zum Zähton; in der Regel tiefreichend (mehr als 40/50 cm) entkalkt)

<b>Morphologie und Boden</b>	<b>Morphologische Beschreibung</b>	Standortseinheiten der ebenen und schwach geneigten Lagen Flachlagen und Rücken
	<b>Bodentyp</b>	Pelosol-Braunerde bis Parabraunerde, zum Teil schwach pseudovergleyt
	<b>Humusform</b>	Mull bis Mullmoder
	<b>Basenausstattung</b>	keine Eingabe
	<b>Podsoligkeit</b>	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	<b>Rutschgefährdung</b>	Keine Rutschgefährdung
<b>Vegetation</b>	<b>Ökologische Artengruppen</b>	Ajuga reptans-, Urtica dioica-, Milium effusum-, Asarum europaeum-, (Stachys sylvatica-, Deschampsia flexuosa-, Mercurialis perennis-, Luzula luzuloides-, Carex flacca-, Melampyrum sylvaticum) - Gruppe
	<b>Aufnahmen</b>	20 Vegetationsaufnahmen (2001 bis 2008)
	<b>Natürliche Waldgesellschaft</b>	Waldmeister-Buchenwald mit Tanne; Waldgersten-Buchenwald mit Tanne
<b>Baumarten des Standortswald</b>	<b>Hauptbaumart(en)</b>	Rotbuche, Weißtanne
	<b>Nebenbaumart(en)</b>	Bergahorn, Gemeine Esche, Gemeine Fichte
	<b>Pionierbaumart(en)</b>	Aspe (Zitterpappel), Salweide, Sandbirke (Hängebirke), Stieleiche, Vogelbeere (Eberesche), Vogelkirsche

Baumarteneignung		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
	geeignet (g)	RBu	1	2	1	1
		Ta	1	2	1	2
	geeignet bis möglich (g/m)	Dgl	1	2	2	2
	möglich (m)	Es	2	2	1	2
		BAh	2	2	1	2
		Fi	2	2	2	2
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	StEi	3	2	1	2
		Kie	3	2	1	2
	sonstige Laubbaumarten	VKir				
	sonstige Nadelbaumarten	ELä				

Vorkommen	<b>Fläche der Standortseinheit</b>	437,8 ha
	<b>Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende</b>	besonders häufig (6,73 %)
	<b>Kartierzeitraum</b>	2010-19 - 16 %
		2000-09 - 6,6 %
		1970-79 - 77,4 %

Organisatorisch	<b>Link zur Regionallegende</b>	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_02_montan.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_02_montan.pdf</a>
	<b>Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung</b>	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_02_montan.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_02_montan.pdf</a>
	<b>Link zur Vegetationsgruppierung</b>	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_02_montan.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_02_montan.pdf</a>
	<b>Zugehörige Kartierobjekte</b>	7610, 10003, 9928, 9610, 10025, 7907

**Impressum**


Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg  
 Abt. Waldnaturschutz  
 Wonnhaldestr. 4  
 79100 Freiburg  
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

**Datenquelle:**

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

**Technische Realisierung:**

 IDaMa GmbH, Freiburg [www.idama.de](http://www.idama.de)