

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Baar-Wutach

Regionale Einheit

5/02 Baar

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

743 (602 bis 904) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

6,8 (6,3-7,1) Ø Temp. / Jahr [°C]


13,4 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

915 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

425 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

wfLKM



h'grün
d'braune Punkte
schwarze Wellenlinien

Tannenwald auf wechselfeuchtem Lettenkeuper-Mischlehm

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

**Schwach bis deutlich wechselfeucht,
örtlich vernässend**

in der

Öko-Serie der vernässenden Lettenkeuper-Mischlehme

(Unterschiedlich stark staunässegezeichnete, geschichtete oder durchmischte Böden mit 25/30 bis 60 cm (selten mehr) kleinsteinig-sandigem Lehm und/oder Schlufflehm (Lösslehm) über Ton oder sandig-tonigen Fließerden des Lettenkeupers)

Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der ebenen und schwach geneigten Lagen Flachlagen
	Bodentyp	Pseudogley und Parabraunerde-Pseudogley
	Humusform	Mull und Mullmoder bis Feuchthumus
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Ajuga reptans-, Urtica dioica-, Milium effusum-, Stachys sylvatica-, (Impatiens noli-tangere-, Juncus-, Deschampsia flexuosa) - Gruppe
	Aufnahmen	7 Vegetationsaufnahmen (2000 bis 2007)
	Natürliche Waldgesellschaft	Labkraut-Tannenwald (typisch); Labkraut-Tannenwald; stellenweise Labkraut-Tannenwald mit Schachtelhalm
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Weißtanne
	Nebenbaumart(en)	Bergahorn, Gemeine Esche, Gemeine Fichte, Rotbuche, Stieleiche
	Pionierbaumart(en)	Aspe (Zitterpappel), Salweide, Sandbirke (Hängebirke), Vogelbeere (Eberesche), Vogelkirsche, Waldkiefer

Baumarteneignung		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
	geeignet (g)	Ta	1	1	1	2
	geeignet bis möglich (g/m)	Es	2	1	2	2
		StEi	2	1	1	2
	möglich (m)	Kie	2	2	1	2
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	Dgl	2	2	3	2
		RBu	2	2	3	2
		Fi	1	3	3	2
	wenig geeignet (w)	BAh	3	2	2	3
	sonstige Laubbaumarten	Aspe				
	sonstige Nadelbaumarten	-				

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	77,6 ha
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	häufig (1,19 %)
	Kartierzeitraum	2010-19 - 10,7 %
		2000-09 - 89,3 %

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_02_montan.pdf
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_02_montan.pdf
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_02_montan.pdf
	Zugehörige Kartierobjekte	9619, 9610, 10003, 10025

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de