

**Waldstandorte  
Baden-  
Württemberg**

**Wuchsgebiet**

Baar-Wutach

**Regionale Einheit**

5/03 Obere Wutach und Bonndorfer Platte

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

806 (531 bis 1090) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)\*

6,8 (5,5-7,2) Ø Temp. / Jahr [°C]


13,3 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

1071 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

444 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

\* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

**BW+**



**Frischer Eschen-Bergahorn-Bergulmen-Bergwald**

Standortskundliche Wasserhaushaltsstufe:

**Überwiegend mäßig frisch, stellenweise frisch**

d'gelb  
d'grüne Schräggitter

**in der Gruppe der Bergwälder**

(Meist sonnseitige, steinschuttreiche, bewegte Muschelkalk-Steilhalden aus dem Oberem Muschelkalk)


<b>Morphologie und Boden</b>	<b>Morphologische Beschreibung</b>	Sonstige, morphologisch bedingte Standortseinheiten meist schattseitige Steilhalden mit bewegtem Kalksteinschutt
	<b>Bodentyp</b>	Kalkschutt-Rendzina (bis Terra fusca)
	<b>Humusform</b>	Mull
	<b>Basenausstattung</b>	keine Eingabe
	<b>Podsoligkeit</b>	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	<b>Rutschgefährdung</b>	latente Rutschgefährdung
<b>Vegetation</b>	<b>Ökologische Artengruppen</b>	Milium effusum-, Mercurialis perennis-, Ajuga reptans-, Impatiens noli-tangere-, Stachys sylvatica - Gruppe
	<b>Aufnahmen</b>	3 Vegetationsaufnahmen (2004)
	<b>Natürliche Waldgesellschaft</b>	Eschen-Ahorn-Steinschutthangwald; Eschen-Ahorn-Steinschutthangwald
<b>Baumarten des Standortswald</b>	<b>Hauptbaumart(en)</b>	Gemeine Esche, Bergahorn, Bergulme
	<b>Nebenbaumart(en)</b>	Sommerlinde, Spitzahorn
	<b>Pionierbaumart(en)</b>	Feldahorn, Mehlbeere, Vogelbeere (Eberesche)

Baumarteneignung		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
	geeignet (g)	Es	1	2	1	2
		BAh	1	2	1	2
	wenig geeignet (w)	RBu	2	2	3	2
		StEi	3	2	2	2
	wenig- bis ungeeignet (w/u)	Kie	3	2	2	2
		Ta	2	2	3	2
	ungeeignet (u)	Dgl	3	2	3	2
		Fi	3	2	3	2
	sonstige Laubbaumarten	BUI, SAh, SLi				
	sonstige Nadelbaumarten	Eibe				

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	5,5 ha
	Anteil der Standortseinheit innerhalb der Regionallegende	selten (0,06 %)
	Kartierzeitraum	2000-09 - 100 %

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_03_montan.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_03_montan.pdf</a>
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_03_montan.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_03_montan.pdf</a>
	Link zur Vegetationsgruppierung	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_03_montan.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_03_montan.pdf</a>
	Zugehörige Kartierobjekte	9610

**Impressum**



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg  
 Abt. Waldnaturschutz  
 Wonnhaldestr. 4  
 79100 Freiburg  
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

**Datenquelle:**

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

**Technische Realisierung:**

IDaMa GmbH, Freiburg [www.idama.de](http://www.idama.de)