

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Baar-Wutach

Regionale Einheit

5/03 Obere Wutach und Bonndorfer Platte

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

806 (531 bis 1090) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

6,8 (5,5-7,2) Ø Temp. / Jahr [°C]

13,3 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


1071 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

444 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

HV+

Buchen-Tannen-Bergahorn-Wald auf frischen Hangverflachungen



blaßd'braun
d'grüne Querstriche
schwarze Rutschpfeile

Standortskundliche Wasserhaushaltsstufe:

Mäßig frisch, stellenweise frisch

in der


Gruppe der Rutschhänge

(Sehr rutschgefährdete schroffe bis steile, von akuten Rutschungen durchsetzte, schattseitige Tonhänge und auch flache, aber quellige Hangfußlagen im Keuper und Muschelkalk, seltener im Lias)

| | | |
|------------------------------------|------------------------------------|---|
| Morphologie und Boden | Morphologische Beschreibung | Sonstige, morphologisch bedingte Standortseinheiten Hangverflachungen und –verebnungen mit unruhigen Geländeformen einschließlich Hangquertälchen in Rutschhangkomplexen; häufig freier Kalk bis zur Oberfläche |
| | Bodentyp | Braunerde, Kalkbraunerde, Pseudogley-Braunerde, Hanggley-Braunerde bis Braunerde-Pelosol, auch Quellengley |
| | Humusform | Mull, stellenweise Mullmoder |
| | Basenausstattung | keine Eingabe |
| | Podsoligkeit | ohne Podsoligkeitsmerkmale |
| | Rutschgefährdung | latente Rutschgefährdung |
| Vegetation | Ökologische Artengruppen | Milium effusum-, Mercurialis perennis-, Stachys sylvatica-, Urtica dioica-, Impatiens noli-tangere-, (Carex montana-, Rubus-, Ajuga reptans-, Asarum europaeum) - Gruppe |
| | Aufnahmen | 3 Vegetationsaufnahmen (2016) |
| | Natürliche Waldgesellschaft | Waldgersten-Buchenwald mit Tanne; Ahorn-Eschenwald |
| Baumarten des Standortswald | Hauptbaumart(en) | Rotbuche, Weißtanne, Bergahorn |
| | Nebenbaumart(en) | Bergulme, Gemeine Esche |
| | Pionierbaumart(en) | Aspe (Zitterpappel), Mehlbeere, Vogelbeere (Eberesche) |

| | Konkurrenzkraft | Pfleglichkeit | Sicherheit | Leistung | | |
|-------------------------|--|---|------------|----------|---|---|
| Baumarteneignung | geeignet (g) | Es | 1 | 2 | 1 | 1 |
| | | BAh | 1 | 2 | 1 | 1 |
| | | RBu | 1 | 2 | 1 | 1 |
| | | Ta | 1 | 2 | 1 | 1 |
| | möglich (m) | Dgl | 2 | 2 | 2 | 1 |
| | | Fi | 2 | 2 | 2 | 1 |
| | wenig geeignet (w) | StEi | 3 | 2 | 1 | 2 |
| | ungeeignet (u) | Kie | 3 | 2 | 2 | 2 |
| | sonstige Laubbaumarten | SAh, VKir | | | | |
| | sonstige Nadelbaumarten | - | | | | |
| Vorkommen | Fläche der Standortseinheit | 22,3 ha | | | | |
| | Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende | gelegentlich/zerstreut (0,31 %) | | | | |
| | Kartierzeitraum | 2000-09 - 100 % | | | | |
| Organisatorisch | Link zur Regionallegende | https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_03_montan.pdf | | | | |
| | Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung | https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_03_montan.pdf | | | | |
| | Link zur Vegetationsgruppierung | https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_03_montan.pdf | | | | |
| | Zugehörige Kartierobjekte | 9610 | | | | |

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de