

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Baar-Wutach

Regionale Einheit

5/03 Obere Wutach und Bonndorfer Platte

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

806 (531 bis 1090) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

6,8 (5,5-7,2) Ø Temp. / Jahr [°C]


13,3 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

1071 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

444 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

KFH



h'gelb
schwarze Dreiecke leer

Kalk-Felshang

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Ohne Angabe zum Wasserhaushalt

in der

Gruppe der felsigen Schroffhänge

(Sehr steile Sommer- und Winterhänge mit schnell wechselnden konkaven und konvexen Hangformen und kleinstandörtlicher Vielfalt, auch mit Felstürmen und felsigen Hangrippen, entlang der Wutach und Haslach, z.T. mit größeren Blockbereichen und Felsgruppen; der starke Flechtenwuchs wird von einem luftfeuchten Kleinklima, das sich an den Unterhängen in einem schluchtwaldartigen Charakter manifestiert, begünstigt)

Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Sonstige, morphologisch bedingte Standortseinheiten sonn- und schattseitig exponierte Prallhänge der Wutach, von flussbegleitenden Rinnen über Kalkschutthänge, Mergel- (Ton) hänge, Rutschhängen bis zu schroffen Felspartien
	Bodentyp	Rohboden, Rendzina-Pelosol, Braunerde-Pelosol bis kolluviale Pararendzina
	Humusform	Mull bis humusfrei
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	keine Eingabe
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Milium effusum-, Ajuga reptans-, Mercurialis perennis-, Impatiens noli-tangere-, Carex montana-, Aruncus dioicus-, Rubus-, Stachys sylvatica-, Filipendula ulmaria - Gruppe
	Aufnahmen	3 Vegetationsaufnahmen (2015 bis 2016)
	Natürliche Waldgesellschaft	Eschen-Ahorn-Steinschutthangwald; Blaugras-Buchenwald; Eschen-Ahorn-Steinschutthangwald; Ahorn-Eschenwald; Waldgersten-Buchenwald
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	
	Nebenbaumart(en)	
	Pionierbaumart(en)	Bergahorn, Bergulme, Feldahorn, Gemeine Esche, Mehlbeere, Salweide, Spitzahorn, Vogelbeere (Eberesche)


B S

Baumarteneignung	Konkurrenzkraft Pfléglichkeit Sicherheit Leistung					
	möglich (m)	StEi	2	2	1	3
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	Es	1	2	2	3
		RBu	1	2	2	3
		Kie	2	2	2	3
	wenig geeignet (w)	Ta	2	2	3	3
	wenig- bis ungeeignet (w/u)	Dgl	2	2	2	3
		BAh	3	2	3	3
		Fi	2	2	3	3
	sonstige Laubbaumarten	BUI, SAh, SLi				
sonstige Nadelbaumarten	Eibe					

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	0 ha
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	gelegentlich/zerstreut (0,23 %)

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_03_montan.pdf
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_03_montan.pdf
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_03_montan.pdf
	Zugehörige Kartierobjekte	

Impressum

 Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de