

**Waldstandorte  
Baden-  
Württemberg**

**Wuchsgebiet**

Baar-Wutach

**Regionale Einheit**

5/03 Obere Wutach und Bonndorfer Platte

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

806 (531 bis 1090) m. ü. NN

Klima 1961-1990 (regionalisiert)

6,8 Ø Temp. / Jahr [°C]

13,3 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

1071 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

444 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

\* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

**KRü-**

**Buchen-Mehlbeeren-Wald auf trockenen Kuppen und Rücken**



d'gelb

h'braune Senkrechtstriche

**Standortskundliche Wasserhaushaltsstufe** Trocken bis mäßig trocken

in der

**Gruppe der Kuppen und Rücken im Deckgebirge**

(Schmale, steinige, lehmig-tonige Rücken und Hangnasen im Muschelkalk und Braunen Jura)


|                                    |                                    |  |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>Morphologie und Boden</b>       | <b>Morphologische Beschreibung</b> | Sonstige, morphologisch bedingte Standortseinheiten schmale Rücken und Hangnasen (im Muschelkalk-, Braunjura- und Wutachbereich) |
|                                    | <b>Bodentyp</b>                    | Rendzina, Mergel-Rendzina und Rendzina-Pelosol, seltener Braunerde-Regosol   |
|                                    | <b>Humusform</b>                   | Mull bis Mullmoder   |
|                                    | <b>Basenausstattung</b>            | keine Eingabe  |
|                                    | <b>Podsoligkeit</b>                | ohne Podsoligkeitsmerkmale   |
|                                    | <b>Rutschgefährdung</b>            | Keine Rutschgefährdung   |
| <b>Vegetation</b>                  | <b>Ökologische Artengruppen</b>    | Carex montana-, Asarum europaeum-, Milium effusum - Gruppe   |
|                                    | <b>Aufnahmen</b>                   | 5 Vegetationsaufnahmen (2015 bis 2017)   |
|                                    | <b>Natürliche Waldgesellschaft</b> | Waldgersten-Buchenwald mit Tanne; Waldgersten-Buchenwald; Seggen-Buchenwald  |
| <b>Baumarten des Standortswald</b> | <b>Hauptbaumart(en)</b>            | Rotbuche, Mehlbeere  |
|                                    | <b>Nebenbaumart(en)</b>            | Weißtanne  |
|                                    | <b>Pionierbaumart(en)</b>          |  |

| Baumarteneignung        |                                       | Konkurrenzkraft | Pfleglichkeit | Sicherheit | Leistung |   |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|------------|----------|---|
|                         | möglich (m)                           | StEi            | 2             | 2          | 1        | 3 |
|                         | möglich und biologisch erwünscht (mb) | RBu             | 1             | 2          | 2        | 3 |
|                         | weniger geeignet (w)                  | Es              | 2             | 2          | 2        | 3 |
|                         |                                       | Kie             | 2             | 2          | 3        | 2 |
|                         | weniger- bis ungeeignet (w/u)         | Dgl             | 2             | 2          | 3        | 3 |
|                         |                                       | BAh             | 2             | 2          | 3        | 3 |
|                         |                                       | Ta              | 2             | 2          | 3        | 3 |
|                         |                                       | Fi              | 2             | 2          | 3        | 3 |
|                         | sonstige Laubbaumarten                | TrEi            |               |            |          |   |
| sonstige Nadelbaumarten | SKie                                  |                 |               |            |          |   |

| Vorkommen | <b>Fläche der Standortseinheit</b> 1,2 ha   |
|-----------|---|
|           | <b>Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende</b> gelegentlich/zerstreut (0,45 %) |
|           | <b>Kartierzeitraum</b> vor1970 - 100 %  |

| Organisatorisch | <b>Link zur Regionallegende</b> <a href="http://www.fva-bw.de/forschung/woe/stoka/legenden/Leg_5_03_montan.pdf">http://www.fva-bw.de/forschung/woe/stoka/legenden/Leg_5_03_montan.pdf</a>                       |
|-----------------|---|
|                 | <b>Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung</b> <a href="http://www.fva-bw.de/forschung/woe/stoka/legenden/BaEig_5_03_montan.pdf">http://www.fva-bw.de/forschung/woe/stoka/legenden/BaEig_5_03_montan.pdf</a> |
|                 | <b>Link zur Vegetationsgruppierung</b> <a href="http://www.fva-bw.de/forschung/woe/stoka/legenden/VegGru_5_03_montan.pdf">http://www.fva-bw.de/forschung/woe/stoka/legenden/VegGru_5_03_montan.pdf</a>          |
|                 | <b>Zugehörige Kartierobjekte</b> 6906 (MRü-)  |

**Impressum**



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg  
 Abt. Waldnaturschutz  
 Wonnhaldestr. 4  
 79100 Freiburg  
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

**Datenquelle:**

© Standortdaten: Landesbetrieb ForstBW

**Technische Realisierung:**

IDaMa GmbH, Freiburg [www.idama.de](http://www.idama.de)