

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Baar-Wutach

Regionale Einheit

5/03 Obere Wutach und Bonndorfer Platte

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

806 (531 bis 1090) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

6,8 (5,5-7,2) Ø Temp. / Jahr [°C]

13,3 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


1071 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

444 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

KSH

Buchen-Tannen-Wald auf mäßig frischem Kalkschutthang



blaßd'braun
h'grüne Schräggitter

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Mäßig frisch

in der


Öko-Serie der Kalkschutthänge

(Flach- bis mittelgründige (25 - 50 cm), auch tiefgründige (60 cm), +/- steinige, lehmige bis schluffig-tonige Lösungsrückstände der Dolomit- und Kalksteinverwitterung des Oberen und Mittleren Muschelkalks mit wechselndem Kalkspiegel im Oberboden; bis 25 cm Schlufflehmauflage oder -beimengung möglich)

Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der meist steilen Hänge schatt- und auch sonnseitige, steile und mäßig steile Hänge und sonnseitige Hangmulden
	Bodentyp	Terra fusca, auch Übergänge zu Rendzina
	Humusform	Mull (bis Mullmoder)
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Milium effusum-, Mercurialis perennis-, Asarum europaeum-, Ajuga reptans-, Rubus-, Urtica dioica-, (Impatiens noli-tangere-, Stachys sylvatica-, Carex montana) - Gruppe
	Aufnahmen	10 Vegetationsaufnahmen (2015 bis 2016)
	Natürliche Waldgesellschaft	Waldgersten-Buchenwald mit Tanne
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche, Weißtanne
	Nebenbaumart(en)	Bergahorn, Spitzahorn
	Pionierbaumart(en)	Feldahorn, Mehlbeere, Vogelbeere (Eberesche)

		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
Baumarteneignung	geeignet (g)	RBu	1	2	1	2
		Ta	1	2	1	2
	möglich (m)	Dgl	2	2	2	2
		Es	2	2	1	2
		BAh	2	2	1	2
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	Kie	3	2	1	2
		Fi	2	2	2	2
	wenig geeignet (w)	StEi	3	2	1	2
	sonstige Laubbaumarten	FAh, SAh, VKir				
	sonstige Nadelbaumarten	ELä				
	Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	60,1 ha			
Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende		häufig (2,33 %)				
Kartierzeitraum		vor1970	-	86,7 %		
		1990-99	-	5,8 %		
		1980-89	-	7,5 %		
Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_03_montan.pdf				
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_03_montan.pdf				
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_03_montan.pdf				
	Zugehörige Kartierobjekte	6907, 6906, 8405, 9409				

Impressum

 Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de