

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Baar-Wutach

Regionale Einheit

5/03 Obere Wutach und Bonndorfer Platte

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

806 (531 bis 1090) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

6,8 (5,5-7,2) Ø Temp. / Jahr [°C]


13,3 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

1071 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

444 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

KSRH



blaßd'braun
schwarze Rutschpfeile

Buchen-Eschen-Wald auf Kalkschutt-Rutschhang

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

**Mäßig frisch, in exponierten Lagen bis
mäßig trocken**

in der


Gruppe der Rutschhänge

(Sehr rutschgefährdete schroffe bis steile, von akuten Rutschungen durchsetzte, schattseitige Tonhänge und auch flache, aber quellige Hangfußlagen im Keuper und Muschelkalk, seltener im Lias)

Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Sonstige, morphologisch bedingte Standortseinheiten zur Zeit beruhigte, meist zungenförmige Rutschmassen mit mindestens 40 cm, meist mehr als 1m Kalk- und Dolomitsteinschutt des Oberen Muschelkalks über mergelig-tonigem Hangschutt
	Bodentyp	Kalkschutt-Rendzina, örtlich bis Terra fusca-Rendzina und Terra fusca-Braunerde
	Humusform	Mull, stellenweise Mullmoder, selten Moder
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Rutschhang in Ruhe
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Milium effusum-, Mercurialis perennis-, Carex montana-, Impatiens noli-tangere-, Ajuga reptans-, Stachys sylvatica-, Rubus-, Urtica dioica-, Asarum europaeum-, Deschampsia flexuosa - Gruppe
	Aufnahmen	5 Vegetationsaufnahmen (2016)
	Natürliche Waldgesellschaft	Seggen-Buchenwald mit Tanne; Waldgersten-Buchenwald; stellenweise Waldgersten-Buchenwald mit Tanne; stellenweise Seggen-Buchenwald
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche, Gemeine Esche
	Nebenbaumart(en)	Bergahorn, Bergulme, Eibe, Weißtanne
	Pionierbaumart(en)	Feldahorn, Mehlbeere, Vogelbeere (Eberesche)

		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
Baumarteneignung	geeignet (g)	Es	1	2	1	2
		RBu	1	2	1	2
	geeignet bis möglich (g/m)	BAh	2	2	1	2
	wenig geeignet (w)	StEi	3	2	1	2
		Kie	3	2	2	2
		Ta	2	2	2	3
	ungeeignet (u)	Dgl	2	2	3	3
		Fi	2	2	3	3
	sonstige Laubbaumarten	SAh, SLi				
	sonstige Nadelbaumarten	Eibe				
Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	10,8 ha				
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	häufig (0,75 %)				
	Kartierzeitraum	2000-09 - 100 %				
Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_03_montan.pdf				
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_03_montan.pdf				
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_03_montan.pdf				
	Zugehörige Kartierobjekte	9610				

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de