

**Waldstandorte  
Baden-  
Württemberg**

**Wuchsgebiet**

Baar-Wutach

**Regionale Einheit**

5/03 Obere Wutach und Bonndorfer Platte

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

806 (531 bis 1090) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)\*

6,8 (5,5-7,2) Ø Temp. / Jahr [°C]

13,3 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


1071 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

444 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

\* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

**KiH-**

**Buchen-Tannen-Wald auf mäßig trockenem Kieshang**



blaßh'grün  
d'braune Schräggitter  
schwarze Kringel (systematisch verteilt)

Standortskundliche  
Wasserhaushaltsstufe:

**Mäßig trocken**

**in der**

**Öko-Serie der Kieshänge**

(Mittelgründiger, mehr als 30 cm, lehmig-sandig-kiesiger Hangschutt aus quarzitischen Schwarzwaldschottern, meist im Bereich der Oberhänge unterhalb der Hangkante entlang der Wutach und Haslach)


<b>Morphologie und Boden</b>	<b>Morphologische Beschreibung</b>	Standortseinheiten der meist steilen Hänge sonenseitige Flach- und Steilhänge, am Rand der Kiesterrassen über der Wutachschlucht
	<b>Bodentyp</b>	Braunerde
	<b>Humusform</b>	Mull, stellenweise Mullmoder
	<b>Basenausstattung</b>	keine Eingabe
	<b>Podsoligkeit</b>	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	<b>Rutschgefährdung</b>	Keine Rutschgefährdung
<b>Vegetation</b>	<b>Ökologische Artengruppen</b>	Milium effusum-, Mercurialis perennis-, Rubus-, Deschampsia flexuosa-, Luzula luzuloides-, Urtica dioica-, Ajuga reptans-, Carex montana - Gruppe
	<b>Aufnahmen</b>	1 Vegetationsaufnahme (2016)
	<b>Natürliche Waldgesellschaft</b>	Waldmeister-Buchenwald mit Tanne
<b>Baumarten des Standortswald</b>	<b>Hauptbaumart(en)</b>	Rotbuche, Weißtanne
	<b>Nebenbaumart(en)</b>	Feldahorn, Gemeine Esche, Mehlbeere, Spitzahorn
	<b>Pionierbaumart(en)</b>	Sandbirke (Hängebirke), Vogelbeere (Eberesche)

Baumarteneignung	Konkurrenzkraft Pfléglichkeit Sicherheit Leistung					
	möglich (m)	Dgl	1	2	2	2
		RBu	1	2	1	3
		StEi	2	2	1	2
	wenig geeignet (w)	BAh	2	2	3	2
		Kie	3	3	1	2
		Ta	2	2	2	3
	wenig- bis ungeeignet (w/u)	Fi	2	3	3	3
	sonstige Laubbaumarten	TrEi				
	sonstige Nadelbaumarten	-				

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	3,3 ha
	Anteil der Standortseinheit innerhalb der Regionallegende	gelegentlich/zerstreut (0,44 %)
	Kartierzeitraum	1980-89 - 100 %

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_03_montan.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_03_montan.pdf</a>
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_03_montan.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_03_montan.pdf</a>
	Link zur Vegetationsgruppierung	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_03_montan.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_03_montan.pdf</a>
	Zugehörige Kartierobjekte	8405 (KH-)

## Impressum

 Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg  
 Abt. Waldnaturschutz  
 Wonnhaldestr. 4  
 79100 Freiburg  
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

## Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

## Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg [www.idama.de](http://www.idama.de)