

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Baar-Wutach

Regionale Einheit

5/03 Obere Wutach und Bonndorfer Platte

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

806 (531 bis 1090) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

6,8 (5,5-7,2) Ø Temp. / Jahr [°C]

13,3 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


1071 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

444 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

KiRH

Buchen-Tannen-Wald auf mäßig frischem tief mergelgründigem Kies-Rutschhang



Standortskundliche Wasserhaushaltsstufe:

mäßig frisch bis frisch, örtlich und am Sonnenhang mäßig trocken

blaßh'grün
schwarze Kringel (systematisch verteilt)
schwarze Rutschpfeile

in der

Gruppe der Rutschhänge

(Sehr rutschgefährdete schroffe bis steile, von akuten Rutschungen durchsetzte, schattseitige Tonhänge und auch flache, aber quellige Hangfußlagen im Keuper und Muschelkalk, seltener im Lias)


Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Sonstige, morphologisch bedingte Standortseinheiten zur Zeit beruhigte, unruhige, mäßig steile Oberhänge unterhalb der Hangkante; Mosaik von Kleinstandorten mit kiesig-schluffigem Sand...
	Bodentyp	Braunerde
	Humusform	Mull, stellenweise Mullmoder, selten Moder
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	keine Eingabe
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Milium effusum-, Mercurialis perennis-, Ajuga reptans-, Rubus-, Impatiens noli-tangere-, Stachys sylvatica-, Carex montana-, (Urtica dioica-, Deschampsia flexuosa-, Luzula luzuloides) - Gruppe
	Aufnahmen	5 Vegetationsaufnahmen (2015 bis 2016)
	Natürliche Waldgesellschaft	Waldgersten-Buchenwald mit Tanne; Waldmeister-Buchenwald mit Tanne
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche, Weißtanne
	Nebenbaumart(en)	Bergahorn, Gemeine Esche, Spitzahorn
	Pionierbaumart(en)	Aspe (Zitterpappel), Vogelbeere (Eberesche)

Baumarteneignung	Konkurrenzkraft Pfléglichkeit Sicherheit Leistung					
	geeignet bis möglich (g/m)	RBu	1	2	2	2
		Ta	1	2	2	2
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	Dgl	2	2	2	2
		BAh	2	2	2	2
		StEi	3	2	1	2
		Kie	3	2	1	2
		Fi	2	2	2	2
	sonstige Laubbaumarten	Aspe, HBU, SaBi				
sonstige Nadelbaumarten	-					

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	0 ha
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	gelegentlich/zerstreut (0,29 %)

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_03_montan.pdf
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_03_montan.pdf
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_03_montan.pdf
	Zugehörige Kartierobjekte	

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de