

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Baar-Wutach

Regionale Einheit

5/03 Obere Wutach und Bonndorfer Platte

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

806 (531 bis 1090) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

6,8 (5,5-7,2) Ø Temp. / Jahr [°C]

13,3 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


1071 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

444 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

Ki

Buchen-Tannen-Wald auf mäßig frischem lehmigem Kiesboden



blaßh'grün
schwarze Kringle (systematisch verteilt)

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Mäßig frisch

in der

Öko-Serie der lehmigen Kiesböden

(Mittel- bis tiefgründiger, sandig-lehmiger Kies bis kiesig-lehmiger Sand der Wutach-, Urdonau-, Haslach-Schotterterrasse; Oberboden z. T. mit (aufgewehtem) Schlufflehm vergütet; im Urdonau-Bereich teils über Tonen und Tonmergeln des Unteren Keupers; meist stärker humos durch frühere landwirtschaftliche Nutzung)

Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der ebenen und schwach geneigten Lagen Flachlagen, v.a. ebene Terrassenlagen über den steilen Wutachhängen
	Bodentyp	Braunerde
	Humusform	Mull bis Moder
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Milium effusum-, Ajuga reptans-, Urtica dioica-, Rubus-, Deschampsia flexuosa-, Mercurialis perennis-, Luzula luzuloides-, Asarum europaeum-, (Vaccinium myrtillus) - Gruppe
	Aufnahmen	6 Vegetationsaufnahmen (2015 bis 2016)
	Natürliche Waldgesellschaft	Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne; Waldmeister-Buchenwald mit Tanne
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Weißtanne, Rotbuche
	Nebenbaumart(en)	Gemeine Esche, Gemeine Fichte, Mehlbeere, Spitzahorn
	Pionierbaumart(en)	Feldahorn, Sandbirke (Hängebirke), Vogelbeere (Eberesche)

Baumarteneignung	Konkurrenzkraft Pflughchkeit Sicherheit Leistung					
	geeignet (g)	Ta	1	2	1	2
	geeignet bis mglich (g/m)	Dgl	1	2	2	2
	mglich (m)	RBu	2	2	1	2
		Fi	1	3	2	1
	mglich bis wenig geeignet (m/w)	Kie	2	3	1	2
	wenig geeignet (w)	BAh	3	2	2	2
	sonstige Laubbaumarten	SaBi				
	sonstige Nadelbaumarten	-				

Vorkommen	Flche der Standortseinheit	20,2 ha
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	hufig (0,9 %)
	Kartierzeitraum	1980-89 - 100 %

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_03_montan.pdf
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_03_montan.pdf
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_03_montan.pdf
	Zugehrige Kartierobjekte	8209 (K), 8405 (K)

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de