

**Waldstandorte  
Baden-  
Württemberg**

**Wuchsgebiet**

Baar-Wutach

**Regionale Einheit**

5/03 Obere Wutach und Bonndorfer Platte

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

806 (531 bis 1090) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)\*

6,8 (5,5-7,2) Ø Temp. / Jahr [°C]

13,3 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


1071 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

444 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

\* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

Me=

**Buchen-Eschen-Mehlbeeren-Wald auf trockenem Mergelrohboden**



h'gelb  
olive Punkte

Standortskundliche  
Wasserhaushaltsstufe:

**Trocken bis wechsell trocken**

in der

**Öko-Serie der Mergelböden und Mergeltone**

(Flach- bis tiefgründige, wenig entwickelte bis lehmig-tonige Mergelverwitterung mit Kalkspiegel zwischen 0 und 40 cm Bodentiefe, über + / - plastizierten dolomitischen Mergeln des Unteren und Mittleren Muschelkalks mit eingeschränkter Karstdrainage; örtlich bis 20 cm Schlufflehmauflage)


<b>Morphologie und Boden</b>	<b>Morphologische Beschreibung</b>	Standortseinheiten der ebenen und schwach geneigten Lagen Flachlagen und Rücken, meist ehemals landwirtschaftlich genutzt
	<b>Bodentyp</b>	Mergel-Rendzina, zum Teil Rohboden
	<b>Humusform</b>	Kalkmoder
	<b>Basenausstattung</b>	keine Eingabe
	<b>Podsoligkeit</b>	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	<b>Rutschgefährdung</b>	Keine Rutschgefährdung
<b>Vegetation</b>	<b>Ökologische Artengruppen</b>	Carex montana-, Vaccinium myrtillus-, Molinia-, (Deschampsia flexuosa) - Gruppe
	<b>Aufnahmen</b>	keine Vegetationsaufnahmen
	<b>Natürliche Waldgesellschaft</b>	
<b>Baumarten des Standortswald</b>	<b>Hauptbaumart(en)</b>	Rotbuche, Gemeine Esche, Mehlbeere
	<b>Nebenbaumart(en)</b>	
	<b>Pionierbaumart(en)</b>	

Baumarteneignung	Konkurrenzkraft Pfléglichkeit Sicherheit Leistung					
	möglich und biologisch erwünscht (mb)	StEi	1	2	1	3
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	Es	1	2	2	3
	wenig geeignet (w)	RBu	1	2	3	3
		Kie	1	2	2	3
	wenig- bis ungeeignet (w/u)	Ta	3	2	3	2
	ungeeignet (u)	Dgl	3	2	3	3
		BAh	3	2	3	3
		Fi	3	2	3	3
	sonstige Laubbaumarten	FAh, MeBe				
sonstige Nadelbaumarten	SKie					

Vorkommen	<b>Fläche der Standortseinheit</b> 23,2 ha
	<b>Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende</b> gelegentlich/zerstreut (0,18 %)
	<b>Kartierzeitraum</b> vor1970 - 100 %

Organisatorisch	<b>Link zur Regionallegende</b> <a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_03_montan.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_03_montan.pdf</a>
	<b>Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung</b> <a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_03_montan.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_03_montan.pdf</a>
	<b>Link zur Vegetationsgruppierung</b> <a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_03_montan.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_03_montan.pdf</a>
	<b>Zugehörige Kartierobjekte</b> 6906 (MB=), 6714 (MB=)

**Impressum**



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg  
 Abt. Waldnaturschutz  
 Wonnhaldestr. 4  
 79100 Freiburg  
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

**Datenquelle:**

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

**Technische Realisierung:**

IDaMa GmbH, Freiburg [www.idama.de](http://www.idama.de)