

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Baar-Wutach

Regionale Einheit

5/03 Obere Wutach und Bonndorfer Platte

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

806 (531 bis 1090) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

6,8 (5,5-7,2) Ø Temp. / Jahr [°C]

13,3 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


1071 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

444 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

MeH-

Buchen-Eschen-Wald auf mäßig trockenem Mergelhang



oliv
d'gelbe Schräggitter
d'gelbe Punkte

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Mäßig trocken bis wechsell trocken

in der

Öko-Serie der Mergelhänge und Mergeltonhänge

(Flach- bis mittelgründige (25 - 40 cm), flachere und steilere Hänge aus mäßig bis schwach plastizierten, lehmig-tonigen Böden, meist mit freiem Kalk bis zur Bodenoberfläche, aus mergeliger Verwitterung vorwiegend des Unteren Muschelkalks, seltener des Keupers)


Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der meist steilen Hänge meist sonnseitige, flache bis mäßig steile Hänge, örtlich mit kleinen Verebnungen
	Bodentyp	Mergel-Rendzina, vereinzelt Pelosol-Rendzina
	Humusform	Mull bis Mullmoder, nach Beweidung auch stellenweise Moder
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Milium effusum-, Mercurialis perennis-, Carex montana-, Asarum europaeum-, Urtica dioica-, (Rubus) - Gruppe
	Aufnahmen	keine Vegetationsaufnahmen
	Natürliche Waldgesellschaft	Seggen-Buchenwald
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche, Gemeine Esche
	Nebenbaumart(en)	Bergahorn, Eibe, Feldahorn, Stieleiche
	Pionierbaumart(en)	Mehlbeere, Sandbirke (Hängebirke), Vogelbeere (Eberesche), Vogelkirsche, Waldkiefer

Baumarteneignung		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
	möglich (m)	Es	1	2	2	2
	möglich und biologisch erwünscht (mb)	RBu	1	2	2	3
		StEi	1	2	1	3
	wenig geeignet (w)	BAh	2	2	2	3
		Kie	2	2	3	2
	wenig- bis ungeeignet (w/u)	Ta	2	2	3	3
	ungeeignet (u)	Dgl	2	2	3	3
		Fi	3	2	3	3
	sonstige Laubbaumarten	Elsbe, FAh, MeBe, SAh				
	sonstige Nadelbaumarten	SKie				

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	60,3 ha
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	häufig (0,67 %)
	Kartierzeitraum	vor1970 - 100 %

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_03_montan.pdf
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_03_montan.pdf
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_03_montan.pdf
	Zugehörige Kartierobjekte	6906

Impressum

 Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de