

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Baar-Wutach

Regionale Einheit

5/03 Obere Wutach und Bonndorfer Platte

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

806 (531 bis 1090) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

6,8 (5,5-7,2) Ø Temp. / Jahr [°C]

13,3 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

1071 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

444 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

Mi

Tannen-Fichten-Kiefern-Wald auf schwach wasserzügiger Misse



Standortskundliche Wasserhaushaltsstufe:

Nass bis wechselfeucht, selten schwach wechselfeucht

blaßviolett
d'grüne Senkrechtstriche

in der

Gruppe der Missen

(Staunasse und quellig-nasse, sandige bis lehmig-sandige, gebleichte Verwitterungsdecken des Buntsandsteins über stauendem, tonigem Unterboden; mit ± feuchten Rohhumus- und torfigen Feuchthumusauflagen zwischen 10 und 30 cm)


Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der ebenen und schwach geneigten Lagen leicht geneigte Flachlagen des Buntsandsteins mit schwachem Wasserzug
	Bodentyp	stark ausgeprägter Pseudogley (Stagnogley-Pseudogley), Stagnogley bis Moor-Stagnogley
	Humusform	Feuchtrohhumus bis Rohhumus, stellenweise Rohhumusartiger Moder
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung

Vegetation	Ökologische Artengruppen	Vaccinium myrtillus-, Deschampsia flexuosa-, Sphagnum-, Luzula luzuloides-, (Ajuga reptans-, Rubus-, Milium effusum-, Pteridium aquilinum) - Gruppe
	Aufnahmen	8 Vegetationsaufnahmen (2017 bis 2018)
	Natürliche Waldgesellschaft	Hainsimsen-Fichten-Tannenwald

Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Weißtanne, Gemeine Fichte, Waldkiefer
	Nebenbaumart(en)	
	Pionierbaumart(en)	

		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung
Baumarteneignung	möglich (m)	Kie	2	2	2
		Ta	1	2	2
		Fi	1	2	3
	wenig- bis ungeeignet (w/u)	Dgl	2	2	3
	ungeeignet (u)	RBu	3	2	3
	sonstige Laubbaumarten	SaBi, Vobe			
	sonstige Nadelbaumarten	-			
Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	126,2 ha			
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	häufig (1,55 %)			
	Kartierzeitraum	vor1970 - 92,8 %			
		1980-89 - 7,2 %			
Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_03_montan.pdf			
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_03_montan.pdf			
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_03_montan.pdf			
	Zugehörige Kartierobjekte	6906, 6714, 8308, 8209			

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de