

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Baar-Wutach

Regionale Einheit

5/03 Obere Wutach und Bonndorfer Platte

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

806 (531 bis 1090) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

6,8 (5,5-7,2) Ø Temp. / Jahr [°C]

13,3 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

1071 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

444 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

RHB

Bergahorn-Eschen-Wald auf Rutschhang in Bewegung



oliv
blaue Rutschpfeile

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Meist frisch bis quellig-feucht

in der


Gruppe der Rutschhänge

(Sehr rutschgefährdete schroffe bis steile, von akuten Rutschungen durchsetzte, schattseitige Tonhänge und auch flache, aber quellige Hangfußlagen im Keuper und Muschelkalk, seltener im Lias)

Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Sonstige, morphologisch bedingte Standortseinheiten geländeunruhige Hanglagen mit Anzeichen junger oder akuter Rutschbewegungen; Mosaik von Kleinstandorten
	Bodentyp	Bodentypenmosaik von Hanggley-Pelosol und Rendzina bis Quellengley
	Humusform	Mull, stellenweise Mullmoder
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	akute Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Ajuga reptans-, Asarum europaeum-, Milium effusum-, Urtica dioica-, Stachys sylvatica-, Mercurialis perennis-, Impatiens noli-tangere-, Rubus-, (Carex montana) - Gruppe
	Aufnahmen	9 Vegetationsaufnahmen (2003 bis 2017)
	Natürliche Waldgesellschaft	Waldgersten-Buchenwald mit Tanne und Hexenkraut; Ahorn-Eschenwald
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Bergahorn, Gemeine Esche
	Nebenbaumart(en)	Bergulme, Eibe, Rotbuche, Sommerlinde, Spitzahorn, Weißtanne
	Pionierbaumart(en)	Aspe (Zitterpappel), Feldahorn, Grauerle (Weißerle), Mehlbeere, Salweide, Vogelbeere (Eberesche)

		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
Baumarteneignung	geeignet (g)	Es	1	2	2	
		BAh	1	2	2	
	möglich (m)	RBu	2	2	2	
	wenig geeignet (w)	StEi	2	2	3	
		Kie	2	2	3	
		Ta	2	2	3	
	ungeeignet (u)	Dgl	3	2	3	
		Fi	3	2	3	
	sonstige Laubbaumarten	Aspe, FAh, SAh, SWei				
	sonstige Nadelbaumarten	Eibe				
Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	239 ha				
	Anteil der Standortseinheit innerhalb der Regionallegende	häufig (2,05 %)				
	Kartierzeitraum	2000-09 - 100 %				
Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_03_montan.pdf				
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_03_montan.pdf				
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_03_montan.pdf				
	Zugehörige Kartierobjekte	9610				

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de