

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Baar-Wutach

Regionale Einheit

5/03 Obere Wutach und Bonndorfer Platte

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

806 (531 bis 1090) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

6,8 (5,5-7,2) Ø Temp. / Jahr [°C]

13,3 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


1071 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

444 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

SWH

**Tannen-Buchen-Wald auf mäßig frischem
Buntsandstein-Winterhang**



orange
h'grüne Schräggitter

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Mäßig frische, selten frisch

in der

Öko-Serie der sandigen Buntsandstein-Steilhänge

(Meist mittelgründige, um 40 cm, sandige bis lehmig-sandige, örtlich auch steinige Böden aus Buntsandstein-Hangschuttverwitterung, blockführend)

| | | |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| Morphologie und Boden | Morphologische Beschreibung | Standortseinheiten der meist steilen Hänge schattseitige Hanglagen |
| | Bodentyp | podsolige bis podsolierte Braunerde |
| | Humusform | Moder bis Rohhumusartiger Moder, stellenweise Rohhumus, nach Kalkung Mullmoder bis Mull |
| | Basenausstattung | keine Eingabe |
| | Podsoligkeit | mäßig podsolig (O-Ahe) |
| | Rutschgefährdung | Keine Rutschgefährdung |
| Vegetation | Ökologische Artengruppen | Deschampsia flexuosa-, Vaccinium myrtillus-, Milium effusum-, Rubus-, Ajuga reptans-, Luzula luzuloides - Gruppe |
| | Aufnahmen | 1 Vegetationsaufnahme (2018) |
| | Natürliche Waldgesellschaft | Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne |
| Baumarten des Standortswald | Hauptbaumart(en) | Weißtanne, Gemeine Fichte, Rotbuche |
| | Nebenbaumart(en) | |
| | Pionierbaumart(en) | |
| | | |

| | | Konkurrenzkraft | Pfleglichkeit | Sicherheit | Leistung | |
|---|---|---|---------------|------------|----------|---|
| Baumarteneignung | geeignet (g) | Dgl | 1 | 1 | 2 | 1 |
| | | Ta | 1 | 1 | 1 | 2 |
| | geeignet bis möglich (g/m) | RBu | 2 | 1 | 1 | 2 |
| | | Fi | 1 | 3 | 1 | 2 |
| | möglich (m) | BAh | 2 | 1 | 2 | 2 |
| | | Kie | 2 | 3 | 1 | 2 |
| | sonstige Laubbaumarten | - | | | | |
| | sonstige Nadelbaumarten | - | | | | |
| | Vorkommen | Fläche der Standortseinheit | 15,2 ha | | | |
| Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende | | gelegentlich/zerstreut (0,27 %) | | | | |
| Kartierzeitraum | | 1980-89 - 100 % | | | | |
| Organisatorisch | Link zur Regionallegende | https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_03_montan.pdf | | | | |
| | Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung | https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_03_montan.pdf | | | | |
| | Link zur Vegetationsgruppierung | https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_03_montan.pdf | | | | |
| | Zugehörige Kartierobjekte | 8209 | | | | |

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de