

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Baar-Wutach

Regionale Einheit

5/03 Obere Wutach und Bonndorfer Platte

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

806 (531 bis 1090) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

6,8 (5,5-7,2) Ø Temp. / Jahr [°C]

13,3 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


1071 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

444 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

T-

Buchen-Traubeneichen-Tannen-Wald auf mäßig trockenem Ton



oliv
d'gelbe Querstriche

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Mäßig trocken, selten wechsell trocken

in der

Öko-Serie der nicht oder wenig vernässenden Tone

(Mehr oder weniger zähplastische Tone aus Verwitterung von Dogger, Mittlerem Keuper und Unterem (und Mittlerem) Muschelkalk; mehr als 40 cm entkalkt; lehmig-schluffige Auflage bis 25 cm möglich)


Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der ebenen und schwach geneigten Lagen Flachlagen und Rücken
	Bodentyp	(flacher) Pelosol und Rendzina-Pelosol
	Humusform	Mull bis Mullmoder, stellenweise Moder
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Milium effusum-, Carex montana-, Rubus-, Mercurialis perennis-, (Ajuga reptans-, Asarum europaeum-, Vaccinium myrtillus-, Deschampsia flexuosa-, Urtica dioica) - Gruppe
	Aufnahmen	2 Vegetationsaufnahmen (2003 bis 2017)
	Natürliche Waldgesellschaft	Waldgersten-Buchenwald mit Tanne; stellenweise Waldgersten-Buchenwald mit Tanne und Maiglöckchen
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche, Stieleiche, Traubeneiche, Weißtanne
	Nebenbaumart(en)	Bergahorn, Gemeine Esche
	Pionierbaumart(en)	Feldahorn, Mehlbeere, Vogelbeere (Eberesche)

Baumarteneignung	Konkurrenzkraft Pflughlichkeit Sicherheit Leistung					
	möglich (m)	RBu	2	2	2	3
		StEi	2	2	1	3
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	Dgl	2	2	2	2
		Kie	2	2	1	2
	wenig geeignet (w)	Es	2	2	1	3
		BAh	2	2	2	3
		Ta	1	2	2	3
	wenig- bis ungeeignet (w/u)	Fi	2	2	3	3
	sonstige Laubbaumarten	SAh, TrEi				
	sonstige Nadelbaumarten	-				

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	7,5 ha			
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	gelegentlich/zerstreut (0,23 %)			
	Kartierzeitraum	vor1970	-	80,3 %	
		2000-09	-	19,7 %	

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_03_montan.pdf
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_03_montan.pdf
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_03_montan.pdf
	Zugehörige Kartierobjekte	6714, 9610

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de