

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Baar-Wutach

Regionale Einheit

5/03 Obere Wutach und Bonndorfer Platte

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

806 (531 bis 1090) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

6,8 (5,5-7,2) Ø Temp. / Jahr [°C]

13,3 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


1071 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

444 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

TL+

Buchen-Tannen-Bergahorn-Wald auf frischem Tonlehm



h'grün
d'grüne Punkte

Standortskundliche Wasserhaushaltsstufe:

Frisch bis grundfrisch

in der

Öko-Serie der nicht oder wenig vernässenden Tonlehme

(Etwa 25 bis 50 cm mehr oder weniger toniger, schluffiger Lehm mit allmählichem Übergang zum unterlagernden zähplastischen Ton (im tieferen Unterboden), Verwitterung und Plastizierung von Tonmergeln des Lias und Doggers; im Unterboden schwache Staunässespuren möglich)


Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der ebenen und schwach geneigten Lagen Flachlagen
	Bodentyp	Parabraunerde (und Braunerde), zum Teil schwach pseudovertigleyt
	Humusform	Mull, stellenweise Mullmoder
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Ajuga reptans-, Stachys sylvatica-, Milium effusum-, Asarum europaeum-, Urtica dioica-, Impatiens noli-tangere-, Rubus-, (Mercurialis perennis-, Luzula luzuloides-, Juncus) - Gruppe
	Aufnahmen	18 Vegetationsaufnahmen (2003 bis 2017)
	Natürliche Waldgesellschaft	Waldmeister-Buchenwald mit Tanne
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche, Weißtanne, Bergahorn
	Nebenbaumart(en)	Gemeine Esche
	Pionierbaumart(en)	Aspe (Zitterpappel), Vogelbeere (Eberesche)

Baumarteneignung		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
	geeignet (g)	Es	1	2	1	1
		BAh	1	2	1	1
		RBu	1	2	1	1
		Ta	1	2	1	1
	geeignet bis möglich (g/m)	Fi	2	2	2	1
	möglich (m)	Dgl	2	2	2	1
	wenig geeignet (w)	StEi	3	2	1	2
	ungeeignet (u)	Kie	3	2	2	2
	sonstige Laubbaumarten	-				
sonstige Nadelbaumarten	-					

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	168,6 ha
	Anteil der Standortseinheit innerhalb der Regionallegende	häufig (1,33 %)
	Kartierzeitraum	2000-09 - 100 %

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_03_montan.pdf
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_03_montan.pdf
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_03_montan.pdf
	Zugehörige Kartierobjekte	9610

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de