

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Baar-Wutach

Regionale Einheit

5/03 Obere Wutach und Bonndorfer Platte

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

806 (531 bis 1090) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

6,8 (5,5-7,2) Ø Temp. / Jahr [°C]

13,3 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


1071 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

444 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

TL-

Buchen-Tannen-Wald auf mäßig trockenem Tonlehm



h'grün
h'braune Punkte

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Mäßig trocken

in der

Öko-Serie der nicht oder wenig vernässenden Tonlehme

(Etwa 25 bis 50 cm mehr oder weniger toniger, schluffiger Lehm mit allmählichem Übergang zum unterlagernden zähplastischen Ton (im tieferen Unterboden), Verwitterung und Plastizierung von Tonmergeln des Lias und Doggers; im Unterboden schwache Staunässespuren möglich)


Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der ebenen und schwach geneigten Lagen flache bis leicht aufgewölbte, sonnseitige Plateau- und Hochflächenränder
	Bodentyp	Pelosol-Braunerde bis Parabraunerde (über Pelosol)
	Humusform	Mull bis Mullmoder
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Milium effusum-, Urtica dioica-, Ajuga reptans-, Asarum europaeum-, Luzula luzuloides-, (Deschampsia flexuosa) - Gruppe
	Aufnahmen	keine Vegetationsaufnahmen
	Natürliche Waldgesellschaft	Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne; Waldmeister-Buchenwald mit Tanne und Hainsimse
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche, Weißtanne
	Nebenbaumart(en)	Bergahorn, Gemeine Esche
	Pionierbaumart(en)	Aspe (Zitterpappel), Vogelbeere (Eberesche)

Baumarteneignung	Konkurrenzkraft Pflughchkeit Sicherheit Leistung					
	geeignet bis mglich (g/m)	Dgl	1	2	2	1
		RBu	1	1	2	2
	mglich (m)	Ta	1	1	1	2
		Fi	1	3	2	2
	mglich bis wenig geeignet (m/w)	Kie	2	3	1	2
	wenig geeignet (w)	Es	3	1	2	2
		BAh	3	1	2	2
	sonstige Laubbaumarten	SAh, TrEi				
	sonstige Nadelbaumarten	-				

Vorkommen	Flche der Standortseinheit	6,3 ha
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	seltene (0,05 %)
	Kartierzeitraum	2000-09 - 100 %

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_03_montan.pdf
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_03_montan.pdf
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_03_montan.pdf
	Zugehrige Kartierobjekte	9610

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de