

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Baar-Wutach

Regionale Einheit

5/03 Obere Wutach und Bonndorfer Platte

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

806 (531 bis 1090) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

6,8 (5,5-7,2) Ø Temp. / Jahr [°C]

13,3 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

1071 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

444 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

TLH+

**Buchen-Tannen-Bergahorn-Wald auf frischem
Tonlehmhang**



h'grün
d'grüne Schräggitter

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Frisch

in der

Öko-Serie der Tonlehmhänge

(Meist flache Hänge mit mehr als 35 cm mächtigen Verwitterungsdecken im Bereich des Braunjura, seltener im Lias-/Keuper-Grenzbereich und im Muschelkalk, aus ± tonigem Lehm mit wechselndem Steingehalt, oberflächlich feinsandig-schluffig bis durchschnittlich 30 cm; nach unten allmählich Übergang vom Lehm zum Zähton im Unterboden; stellenweise auch Fließerden)


Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der meist steilen Hänge schattseitige, meist flache bis mäßig steile Hänge und Hangmulden
	Bodentyp	Braunerde, auch Parabraunerde, z.T. schwach pseudovergleyt
	Humusform	Mull, selten Mullmoder
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	latente Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Milium effusum-, Ajuga reptans-, Urtica dioica-, Stachys sylvatica-, Rubus-, Asarum europaeum-, Impatiens noli-tangere-, Luzula luzuloides - Gruppe
	Aufnahmen	8 Vegetationsaufnahmen (2003 bis 2017)
	Natürliche Waldgesellschaft	Waldmeister-Buchenwald mit Tanne
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche, Weißtanne, Bergahorn
	Nebenbaumart(en)	Gemeine Esche
	Pionierbaumart(en)	Aspe (Zitterpappel), Vogelbeere (Eberesche)

Baumarteneignung		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
	geeignet (g)	Es	1	2	1	1
		BAh	1	2	1	1
		RBu	1	2	1	1
		Ta	1	2	1	1
	geeignet bis möglich (g/m)	Fi	2	2	2	1
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	Dgl	2	2	2	1
	wenig geeignet (w)	StEi	3	2	1	2
	ungeeignet (u)	Kie	3	2	1	2
	sonstige Laubbaumarten	VKir				
sonstige Nadelbaumarten	-					

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	41,5 ha
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	gelegentlich/zerstreut (0,34 %)
	Kartierzeitraum	2000-09 - 100 %

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_03_montan.pdf
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_03_montan.pdf
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_03_montan.pdf
	Zugehörige Kartierobjekte	9610

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de