

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Baar-Wutach

Regionale Einheit

5/03 Obere Wutach und Bonndorfer Platte

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

806 (531 bis 1090) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

6,8 (5,5-7,2) Ø Temp. / Jahr [°C]

13,3 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


1071 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

444 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

hKi

Buchen-Tannen-Wald auf humosem mäßig frischem lehmigem Kiesboden



blaßh'grün
d'braune Punkte
schwarze Kringel (systematisch verteilt)

Standortskundliche Wasserhaushaltsstufe:

Mäßig frisch, selten grundfrisch

in der

Öko-Serie der lehmigen Kiesböden

(Mittel- bis tiefgründiger, sandig-lehmiger Kies bis kiesig-lehmiger Sand der Wutach-, Urdonau-, Haslach-Schotterterrasse; Oberboden z. T. mit (aufgewehem) Schlufflehm vergütet; im Urdonau-Bereich teils über Tonen und Tonmergeln des Unteren Keupers; meist stärker humos durch frühere landwirtschaftliche Nutzung)

Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der ebenen und schwach geneigten Lagen Flachlagen, v.a. ebene Terrassenlagen über den steilen Wutachhängen
	Bodentyp	humose Braunerde
	Humusform	Mull, selten Mullmoder
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	keine Eingabe

Vegetation	Ökologische Artengruppen	Milium effusum-, Rubus-, Ajuga reptans-, Mercurialis perennis-, Urtica dioica-, Stachys sylvatica-, (Impatiens noli-tangere-, Luzula luzuloides) - Gruppe
	Aufnahmen	2 Vegetationsaufnahmen (2016)
	Natürliche Waldgesellschaft	Waldmeister-Buchenwald mit Tanne

Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche, Weißtanne
	Nebenbaumart(en)	
	Pionierbaumart(en)	

Baumarteneignung	Konkurrenzkraft Pfléglichkeit Sicherheit Leistung					
	geeignet (g)	Ta	1	2	1	2
	geeignet bis möglich (g/m)	Dgl	1	2	2	2
		RBu	1	2	2	2
	möglich (m)	Fi	1	3	2	1
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	StEi	3	2	1	2
		Kie	2	3	1	2
	wenig geeignet (w)	BAh	3	2	2	2
	sonstige Laubbaumarten	Aspe, HBu, SaBi				
	sonstige Nadelbaumarten	-				

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit 0 ha
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende häufig (0,52 %)

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_03_montan.pdf
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_03_montan.pdf
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_03_montan.pdf
	Zugehörige Kartierobjekte	

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de