

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Baar-Wutach

Regionale Einheit

5/03 Obere Wutach und Bonndorfer Platte

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

806 (531 bis 1090) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

6,8 (5,5-7,2) Ø Temp. / Jahr [°C]

13,3 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

1071 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

444 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

IStWH

Buchen-Tannen-Wald auf mäßig frischem lehmigem Steinschutt-Winterhang



satth'grün
h'grüne Schräggitter
schwarze Senkrechtstrichelung

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Mäßig frisch

in der

Öko-Serie der lehmigen Steinschutthänge

(Flach- bis mittelgründiger (25 - 40 cm), stark bis sehr stark steiniger, lehmig-sandig-grusiger Hangschutt aus Granitverwitterung mit eingeregeltten Steinplatten auch schon im Oberboden und örtlich auch mit auflagerndem Steinschutt ; im Übergang zum Buntsandstein örtlich stärker sandig-lehmig)


| | | |
|------------------------------------|------------------------------------|---|
| Morphologie und Boden | Morphologische Beschreibung | Standortseinheiten der meist steilen Hänge Hanglagen, meist Mittel- und Oberhänge |
| | Bodentyp | Braunerde, stellenweise auch Ranker-Braunerde |
| | Humusform | Mull bis Mullmoder, örtlich Moder |
| | Basenausstattung | keine Eingabe |
| | Podsoligkeit | ohne Podsoligkeitsmerkmale |
| | Rutschgefährdung | Keine Rutschgefährdung |
| Vegetation | Ökologische Artengruppen | Milium effusum-, Deschampsia flexuosa-, Ajuga reptans-, Vaccinium myrtillus-, Luzula luzuloides-, Rubus-, (Asarum europaeum-, Urtica dioica) - Gruppe |
| | Aufnahmen | 3 Vegetationsaufnahmen (2017) |
| | Natürliche Waldgesellschaft | Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne |
| Baumarten des Standortswald | Hauptbaumart(en) | Rotbuche, Weißtanne |
| | Nebenbaumart(en) | |
| | Pionierbaumart(en) | |
| | | |

| Baumarteneignung | Konkurrenzkraft Pflughchkeit Sicherheit Leistung | | | | | |
|------------------|--|-----|---|---|---|---|
| | geeignet (g) | Ta | 1 | 2 | 1 | 2 |
| | geeignet bis mglich (g/m) | Dgl | 1 | 2 | 2 | 1 |
| | | RBu | 1 | 2 | 2 | 2 |
| | | Fi | 1 | 3 | 1 | 1 |
| | mglich (m) | BAh | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | wenig geeignet (w) | Kie | 3 | 2 | 2 | 1 |
| | sonstige Laubbaumarten | - | | | | |
| | sonstige Nadelbaumarten | - | | | | |

| | | | | | |
|-----------|--|----------------|---|--------|--|
| Vorkommen | Flche der Standortseinheit | 14,2 ha | | | |
| | Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende | hufig (0,55 %) | | | |
| | Kartierzeitraum | 1980-89 | - | 23,3 % | |
| | | 1970-79 | - | 76,7 % | |

| | | | | | |
|-----------------|--|---|--|--|--|
| Organisatorisch | Link zur Regionallegende | https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_03_montan.pdf | | | |
| | Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung | https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_03_montan.pdf | | | |
| | Link zur Vegetationsgruppierung | https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_03_montan.pdf | | | |
| | Zugehrige Kartierobjekte | 7908, 8308 | | | |

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de