

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Baar-Wutach

Regionale Einheit

5/03 Obere Wutach und Bonndorfer Platte

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

806 (531 bis 1090) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

6,8 (5,5-7,2) Ø Temp. / Jahr [°C]

13,3 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


1071 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

444 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

IgWH+

Buchen-Tannen-Bergahorn-Wald auf frischem lehmig-grusigem Winterhang



satth'grün
d'grüne Schräggitter
d'grüne Senkrechtstrichelung

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Frisch

in der


Öko-Serie der lehmigen Grushänge

(Mittel- bis tiefgründiger (40 - 60 cm), lehmig-sandig-grusiger, örtlich auch stärker steiniger Hangschutt aus Granit- und Gneisverwitterung; im Übergangsbereich zum Buntsandstein stärker sandig-lehmige Böden; im Bereich der Haslach und der Wutach im Oberhangbereich Kiesüberlagerung bzw. -beimengung)

Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der meist steilen Hänge schattseitige (breite) Hangmulden und Unterhänge, häufig nur mäßig steil
	Bodentyp	Braunerde, meist humos
	Humusform	Mull bis Mullmoder
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Ajuga reptans-, Asarum europaeum-, Milium effusum-, Urtica dioica-, Rubus-, Luzula luzuloides-, Stachys sylvatica-, Mercurialis perennis-, (Impatiens noli-tangere-, Vaccinium myrtillus) - Gruppe
	Aufnahmen	10 Vegetationsaufnahmen (2017 bis 2018)
	Natürliche Waldgesellschaft	Waldmeister-Buchenwald mit Tanne
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche, Weißtanne, Bergahorn
	Nebenbaumart(en)	
	Pionierbaumart(en)	

		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
Baumarteneignung	geeignet (g)	BAh	1	2	1	1
		RBu	1	2	1	1
		Ta	1	2	1	1
	geeignet bis möglich (g/m)	Dgl	1	2	2	1
		Fi	2	2	1	1
	möglich (m)	Es	2	2	2	2
	wenig geeignet (w)	Kie	3	3	2	2
	sonstige Laubbaumarten	BUI				
	sonstige Nadelbaumarten	-				
Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	18,3 ha				
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	häufig (1,14 %)				
	Kartierzeitraum	1990-99	-	4,4 %		
		1980-89	-	28,6 %		
		1970-79	-	67 %		
Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_03_montan.pdf				
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_03_montan.pdf				
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_03_montan.pdf				
	Zugehörige Kartierobjekte	7908, 8209, 9409				

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de