

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Baar-Wutach

Regionale Einheit

5/03 Obere Wutach und Bonndorfer Platte

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

806 (531 bis 1090) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

6,8 (5,5-7,2) Ø Temp. / Jahr [°C]

13,3 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


1071 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

444 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

metRH

Buchen-Eschen-Wald auf mäßig frischem mergeligen Rutschhang



oliv
olive Querstriche
schwarze Rutschpfeile

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

mäßig frisch, stellenweise frisch

in der


Gruppe der Rutschhänge

(Sehr rutschgefährdete schroffe bis steile, von akuten Rutschungen durchsetzte, schattseitige Tonhänge und auch flache, aber quellige Hangfußlagen im Keuper und Muschelkalk, seltener im Lias)

Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Sonstige, morphologisch bedingte Standortseinheiten Zur Zeit beruhigte, schattseitig exponierte, ältere Rutschungen aus verlagertem mergeltonigen und seltener mergeligen unterschiedlich plastizierten Verwitterungsdecken des Keupers
	Bodentyp	Bodentypenmosaik von Mergelrohboden über Mergel-Rendzina bis Rendzina-Pelosol
	Humusform	Mull, selten Mullmoder
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	keine Eingabe
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Milium effusum-, Mercurialis perennis-, Ajuga reptans-, Stachys sylvatica-, Impatiens noli-tangere-, Urtica dioica-, Rubus-, Asarum europaeum-, Carex montana - Gruppe
	Aufnahmen	4 Vegetationsaufnahmen (2015 bis 2016)
	Natürliche Waldgesellschaft	Waldgersten-Buchenwald mit Tanne; Seggen-Buchenwald mit Tanne
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche, Gemeine Esche
	Nebenbaumart(en)	Bergahorn, Bergulme, Eibe, Weißtanne
	Pionierbaumart(en)	Vogelbeere (Eberesche)

		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
Baumarteneignung	geeignet bis möglich (g/m)	Es	1	2	1	2
	möglich (m)	BAh	2	2	2	2
		RBu	1	2	2	2
		StEi	2	2	1	2
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	Kie	3	2	1	2
		Ta	2	2	2	2
	wenig geeignet (w)	Dgl	2	2	3	2
		Fi	2	2	3	2
	sonstige Laubbaumarten	SAh, SLi, VKir				
	sonstige Nadelbaumarten	Eibe				
	Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	0 ha			
Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende		häufig (0,68 %)				
Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_03_montan.pdf				
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_03_montan.pdf				
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_03_montan.pdf				
	Zugehörige Kartierobjekte					

Impressum

 Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de