

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Baar-Wutach

Regionale Einheit

5/03 Obere Wutach und Bonndorfer Platte

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

806 (531 bis 1090) m. ü. NN

Klima 1961-1990 (regionalisiert)

6,8 Ø Temp. / Jahr [°C]

13,3 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

1071 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

444 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

metRü-

Buchen-Mehlbeeren-Wald auf mäßig trockenen mergelig-tonigen Rücken



blaßoliv
d'gelbe Senkrechtstriche

Standortskundliche Wasserhaushaltsstufe Mäßig trocken bis trocken

in der

Gruppe der Kuppen und Rücken im Deckgebirge

(Schmale, steinige, lehmig-tonige Rücken und Hangnasen im Muschelkalk und Braunen Jura)


| | | |
|------------------------------------|------------------------------------|---|
| Morphologie und Boden | Morphologische Beschreibung | Sonstige, morphologisch bedingte Standortseinheiten überwiegend sonnseitig exponierte Rücken und Hangrücken |
| | Bodentyp | Pelosol-Rendzina bis Braunerde-Pelosol |
| | Humusform | Mull |
| | Basenausstattung | keine Eingabe |
| | Podsoligkeit | ohne Podsoligkeitsmerkmale |
| | Rutschgefährdung | Keine Rutschgefährdung |
| Vegetation | Ökologische Artengruppen | Asarum europaeum-, Carex montana-, Milium effusum-, Mercurialis perennis-, Urtica dioica-, (Ajuga reptans-, Luzula luzuloides) - Gruppe |
| | Aufnahmen | 3 Vegetationsaufnahmen (2003 bis 2004) |
| | Natürliche Waldgesellschaft | Seggen-Buchenwald |
| Baumarten des Standortswald | Hauptbaumart(en) | Rotbuche, Mehlbeere |
| | Nebenbaumart(en) | Gemeine Esche, Sommerlinde, Spitzahorn |
| | Pionierbaumart(en) | Feldahorn, Vogelbeere (Eberesche) |
| | | |

| Baumarteneignung | | Konkurrenzkraft | Pfleglichkeit | Sicherheit | Leistung | |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|------------|----------|---|
| | möglich (m) | Es | 2 | 2 | 2 | 3 |
| | | StEi | 2 | 2 | 1 | 3 |
| | möglich und biologisch erwünscht (mb) | RBu | 1 | 2 | 2 | 3 |
| | weniger geeignet (w) | BAh | 2 | 2 | 3 | 3 |
| | | Kie | 2 | 2 | 2 | 3 |
| | ungeeignet (u) | Dgl | 2 | 2 | 3 | 3 |
| | | Ta | 2 | 2 | 3 | 3 |
| | | Fi | 2 | 2 | 3 | 3 |
| | sonstige Laubbaumarten | FAh, MeBe | | | | |
| sonstige Nadelbaumarten | - | | | | | |

| Vorkommen | Fläche der Standortseinheit | 22,5 ha |
|-----------|---|---------------------------------|
| | Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende | gelegentlich/zerstreut (0,36 %) |
| | Kartierzeitraum | 2000-09 - 100 % |

| Organisatorisch | Link zur Regionallegende | http://www.fva-bw.de/forschung/woe/stoka/legenden/Leg_5_03_montan.pdf |
|-----------------|---|---|
| | Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung | http://www.fva-bw.de/forschung/woe/stoka/legenden/BaEig_5_03_montan.pdf |
| | Link zur Vegetationsgruppierung | http://www.fva-bw.de/forschung/woe/stoka/legenden/VegGru_5_03_montan.pdf |
| | Zugehörige Kartierobjekte | 9610 |

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesbetrieb ForstBW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de