

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Baar-Wutach

Regionale Einheit

5/03 Obere Wutach und Bonndorfer Platte

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

806 (531 bis 1090) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

6,8 (5,5-7,2) Ø Temp. / Jahr [°C]


13,3 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

1071 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

444 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

sometRH



Buchen-Eschen-Wald auf sonnseitigem mäßig frischem mergelig-tonigem Rutschhang

Standortskundliche Wasserhaushaltsstufe:

meist mäßig frisch, zum Teil bis mäßig trocken und wechsell trocken

bläßoliv
olive Querstriche
schwarze Rutschpfeile

in der


Gruppe der Rutschhänge

(Sehr rutschgefährdete schroffe bis steile, von akuten Rutschungen durchsetzte, schattseitige Tonhänge und auch flache, aber quellige Hangfußlagen im Keuper und Muschelkalk, seltener im Lias)

Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Sonstige, morphologisch bedingte Standortseinheiten zur Zeit beruhigte, sonnseitig exponierte, unruhige, flache und mäßig steile Hänge; Mosaik von Kleinstandorten, wechselnd mit freiem Kalk und unterschiedlich plastiziert
	Bodentyp	Braunerde-Pelosol bis Mergel-Rendzina, auch Kalkpelosol
	Humusform	Mull, selten Mullmoder
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Rutschhang in Ruhe
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Milium effusum-, Mercurialis perennis-, Carex montana-, Ajuga reptans-, Impatiens noli-tangere-, Aruncus dioicus-, Asarum europaeum-, Stachys sylvatica-, Rubus - Gruppe
	Aufnahmen	3 Vegetationsaufnahmen (2004 bis 2016)
	Natürliche Waldgesellschaft	Waldgersten-Buchenwald mit Tanne; Seggen-Buchenwald
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche, Gemeine Esche
	Nebenbaumart(en)	Bergahorn, Bergulme, Eibe, Weißtanne
	Pionierbaumart(en)	Feldahorn, Mehlbeere, Vogelbeere (Eberesche)

		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
Baumarteneignung	geeignet (g)	Es	1	2	1	2
	geeignet bis möglich (g/m)	RBu	1	2	2	3
	möglich (m)	BAh	2	2	2	3
		StEi	2	2	1	2
	wenig geeignet (w)	Kie	3	2	2	2
		Ta	2	2	2	3
	wenig- bis ungeeignet (w/u)	Dgl	2	2	3	3
		Fi	2	2	3	3
	sonstige Laubbaumarten	FAh, MeBe, SAh				
	sonstige Nadelbaumarten	Eibe				
Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	24 ha				
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	häufig (0,73 %)				
	Kartierzeitraum	2000-09 - 100 %				
Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_03_montan.pdf				
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_03_montan.pdf				
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_03_montan.pdf				
	Zugehörige Kartierobjekte	9610				

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de