

**Waldstandorte  
Baden-  
Württemberg**

**Wuchsgebiet**

Baar-Wutach

**Regionale Einheit**

5/03 Obere Wutach und Bonndorfer Platte

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

806 (531 bis 1090) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)\*

6,8 (5,5-7,2) Ø Temp. / Jahr [°C]

13,3 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


1071 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

444 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

\* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

tSe+

**Bergahorn-Tannen-Eschen-Wald in frischen Tonsenken**



d'grün  
olive Querstriche

Standortskundliche  
Wasserhaushaltsstufe:

**Frisch bis feucht**

in der


<b>Morphologie und Boden</b>	<b>Morphologische Beschreibung</b>	Sonstige, morphologisch bedingte Standortseinheiten Senken und breitere Rinnen (im Muschelkalk und Keuper)
	<b>Bodentyp</b>	Braunerde und Pelosol-Braunerde bis Pelosol-Gley
	<b>Humusform</b>	Mull, selten Mullmoder
	<b>Basenausstattung</b>	keine Eingabe
	<b>Podsoligkeit</b>	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	<b>Rutschgefährdung</b>	Keine Rutschgefährdung
<b>Vegetation</b>	<b>Ökologische Artengruppen</b>	Milium effusum-, Urtica dioica-, Ajuga reptans-, Asarum europaeum-, Rubus-, Mercurialis perennis-, Impatiens noli-tangere-, Stachys sylvatica - Gruppe
	<b>Aufnahmen</b>	8 Vegetationsaufnahmen (2003 bis 2017)
	<b>Natürliche Waldgesellschaft</b>	Waldgersten-Buchenwald mit Tanne; Ahorn-Eschenwald mit Tanne; stellenweise Ahorn-Eschenwald
<b>Baumarten des Standortswald</b>	<b>Hauptbaumart(en)</b>	Bergahorn, Weißtanne, Gemeine Esche
	<b>Nebenbaumart(en)</b>	Bergulme, Hainbuche (Weißbuche), Rotbuche, Spitzahorn
	<b>Pionierbaumart(en)</b>	Aspe (Zitterpappel), Stieleiche, Vogelbeere (Eberesche)

Baumarteneignung		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
	geeignet (g)	Es	1	2	1	1
		BAh	1	2	1	1
		Ta	1	2	2	1
	möglich (m)	RBu	2	2	2	1
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	Dgl	2	2	3	1
		StEi	3	2	1	2
	wenig geeignet (w)	Fi	2	2	3	1
	ungeeignet (u)	Kie	3	2	2	3
	sonstige Laubbaumarten	SEr, VKir				
sonstige Nadelbaumarten	-					

Vorkommen	<b>Fläche der Standortseinheit</b>	31,3 ha
	<b>Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende</b>	häufig (0,61 %)
	<b>Kartierzeitraum</b>	vor1970 - 25,3 %
		2000-09 - 74,7 %

Organisatorisch	<b>Link zur Regionallegende</b>	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_03_montan.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_03_montan.pdf</a>
	<b>Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung</b>	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_03_montan.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_03_montan.pdf</a>
	<b>Link zur Vegetationsgruppierung</b>	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_03_montan.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_03_montan.pdf</a>
	<b>Zugehörige Kartierobjekte</b>	9610, 6906 (tSe), 6714 (tSe)

**Impressum**



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg  
 Abt. Waldnaturschutz  
 Wonnhaldestr. 4  
 79100 Freiburg  
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

**Datenquelle:**

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

**Technische Realisierung:**

IDaMa GmbH, Freiburg [www.idama.de](http://www.idama.de)