

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Baar-Wutach

Regionale Einheit

5/03 Obere Wutach und Bonndorfer Platte

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

806 (531 bis 1090) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

6,8 (5,5-7,2) Ø Temp. / Jahr [°C]

13,3 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

1071 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

444 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

wzMi



Fichten-Tannen-Wald auf wasserzügiger Misse

Standortskundliche Wasserhaushaltsstufe:

Schwach wechselfeucht bis wechselfeucht und grundfeucht, wasserzünftig

blaßviolett
d'grüne Senkrechtstriche doppelt einfarbig

in der

Gruppe der Missen

(Stauanasse und quellig-nasse, sandige bis lehmig-sandige, gebleichte Verwitterungsdecken des Buntsandsteins über stauendem, tonigem Unterboden; mit ± feuchten Rohhumus- und torfigen Feuchthumusauflagen zwischen 10 und 30 cm)

Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der ebenen und schwach geneigten Lagen Muldenformen und stärker geneigte Flachlagen im Buntsandstein und im Grenzbereich zum Kristallin
	Bodentyp	Gley-Pseudogley und Pseudogley (bis Stagnogley)
	Humusform	Feuchtrohumus, stellenweise Rohhumusartiger Moder bis Rohhumus, selten Feuchtmoder
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Vaccinium myrtillus-, Deschampsia flexuosa-, Milium effusum-, Sphagnum-, (Luzula luzuloides-, Ajuga reptans-, Pteridium aquilinum-, Rubus) - Gruppe
	Aufnahmen	4 Vegetationsaufnahmen (2017 bis 2018)
	Natürliche Waldgesellschaft	Hainsimsen-Fichten-Tannenwald
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Gemeine Fichte, Weißtanne
	Nebenbaumart(en)	
	Pionierbaumart(en)	

		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
Baumarteneignung	geeignet bis möglich (g/m)	Ta	1	2	2	1
	möglich (m)	Kie	2	2	2	2
		Fi	1	2	3	2
	wenig geeignet (w)	Dgl	2	2	3	3
	ungeeignet (u)	RBu	3	2	3	3
	sonstige Laubbaumarten	SaBi				
	sonstige Nadelbaumarten	-				
Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	177,2 ha				
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	häufig (1,53 %)				
	Kartierzeitraum	vor1970	-	71,3 %		
		1980-89	-	8,5 %		
		1970-79	-	20,1 %		
Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_03_montan.pdf				
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_03_montan.pdf				
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_03_montan.pdf				
	Zugehörige Kartierobjekte	6906 (Mi+), 7908 (Mi+), 6714 (Mi+), 8308 (Mi+)				

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de