

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Baar-Wutach

Regionale Einheit

5/04 Untere Wutach und südöstlicher Hotzenwald

Standortskundliche Höhenstufe

kollin

Höhenverbreitung (Wald)

430 (297 bis 616) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

9 Ø Temp. / Jahr [°C]

15,7 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


1108 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

451 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

kDSH-

Buchenwald auf mäßig trockenem Dolomitschutthang



blaßd'braun
d'braune Schräggitter
schwarze Sandpunkte

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Mäßig trocken

in der

Öko-Serie der Dolomitschutthänge

(Flach- bis mittelgründige, selten tiefgründige, durchlässige, steinig-lehmige bis tonig-lehmige Lösungsrückstände der Dolomit-, stellenweise der Kalksteinverwitterung des Oberen Muschelkalks mit wechselnder Entkarbonatisierungstiefe; Feinerde meist diffus karbonatisch)


Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der Hänge meist sonnseitige Oberhänge und schattseitige Hangrücken
	Bodentyp	Terra fusca, selten Rendzina-Terra fusca
	Humusform	Mull (bis Moder)
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Mercurialis perennis-, Carex montana-, Asarum europaeum-, Milium effusum - Gruppe
	Aufnahmen	12 Vegetationsaufnahmen (2008 bis 2009)
	Natürliche Waldgesellschaft	Waldgersten-Buchenwald mit Maiglöckchen; stellenweise Waldgersten-Buchenwald
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche
	Nebenbaumart(en)	Feldahorn, Gemeine Esche, Hainbuche (Weißbuche), Spitzahorn, Traubeneiche, Vogelkirsche, Winterlinde
	Pionierbaumart(en)	Elsbeere, Mehlbeere, Salweide, Sandbirke (Hängebirke)

Baumarteneignung	Konkurrenzkraft Pfléglichkeit Sicherheit Leistung					
	geeignet bis möglich (g/m)	RBu	1	2	1	2
	möglich (m)	Es	2	2	1	2
		TrEi	2	2	1	2
	wenig geeignet (w)	BAh	3	2	2	2
	wenig- bis ungeeignet (w/u)	Kie	3	3	2	2
	ungeeignet (u)	Dgl	3	2	3	3
		Ta	3	2	3	3
		Fi	2	3	3	3
	sonstige Laubbaumarten	FAh, HBu, SAh, VKir				
sonstige Nadelbaumarten	Eibe					

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	135,4 ha			
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	besonders häufig (9,93 %)			
	Kartierzeitraum	2010-19	-	72,5 %	
		2000-09	-	7,1 %	
		1970-79	-	20,4 %	

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_04_kollin.pdf
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_04_kollin.pdf
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_04_kollin.pdf
	Zugehörige Kartierobjekte	10016, 7912 (DSH-), 9952, 7908 (DSH-)

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de