

**Waldstandorte  
Baden-  
Württemberg**

**Wuchsgebiet**

Baar-Wutach

**Regionale Einheit**

5/04 Untere Wutach und südöstlicher Hotzenwald

Standortskundliche Höhenstufe

kollin

Höhenverbreitung (Wald)

430 (297 bis 616) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)\*

9 Ø Temp. / Jahr [°C]

15,7 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

1108 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

451 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

\* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

**kRi+**

**Bergahorn-Eschen-Wald in frischen Rinnen und Senken**



Standortskundliche Wasserhaushaltsstufe:

**Frisch, örtlich bis grundfeucht und feucht**

d'grün

in der

**Gruppe der Rinnen, Senken und sonstigen konkaven Lagen**


<b>Morphologie und Boden</b>	<b>Morphologische Beschreibung</b>	Sonstige, morphologisch bedingte Standortseinheiten Rinnen, Senken und Bachtälchen
	<b>Bodentyp</b>	(kolluvial beeinflusste) Terra fusca und Braunerde
	<b>Humusform</b>	Mull
	<b>Basenausstattung</b>	keine Eingabe
	<b>Podsoligkeit</b>	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	<b>Rutschgefährdung</b>	Keine Rutschgefährdung
<b>Vegetation</b>	<b>Ökologische Artengruppen</b>	Ajuga reptans-, Stachys sylvatica-, Milium effusum-, Asarum europaeum - Gruppe
	<b>Aufnahmen</b>	1 Vegetationsaufnahme (2009)
	<b>Natürliche Waldgesellschaft</b>	Ahorn-Eschenwald; Ahorn-Eschenwald (typisch)
<b>Baumarten des Standortswald</b>	<b>Hauptbaumart(en)</b>	Bergahorn, Gemeine Esche
	<b>Nebenbaumart(en)</b>	Bergulme, Rotbuche, Vogelkirsche, Weißtanne, Winterlinde
	<b>Pionierbaumart(en)</b>	Salweide, Schwarzerle (Roterle)

Baumarteneignung		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
	geeignet (g)	Es	1	2	1	1
		BAh	1	2	2	1
	geeignet bis möglich (g/m)	RBu	1	2	2	1
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	TrEi	3	2	1	2
		Ta	2	2	2	2
	wenig geeignet (w)	Fi	2	3	3	1
	wenig- bis ungeeignet (w/u)	Dgl	3	2	3	2
	ungeeignet (u)	Kie	3	3	2	3
	sonstige Laubbaumarten	BUI, SEr, VKir, WLi				
sonstige Nadelbaumarten	-					

Vorkommen	<b>Fläche der Standortseinheit</b>	41,6 ha			
	<b>Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende</b>	besonders häufig (3,05 %)			
	<b>Kartierzeitraum</b>	2010-19	-	38,2 %	
		2000-09	-	53,2 %	
		1970-79	-	8,6 %	

Organisatorisch	<b>Link zur Regionallegende</b>	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_04_kollin.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_04_kollin.pdf</a>
	<b>Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung</b>	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_04_kollin.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_04_kollin.pdf</a>
	<b>Link zur Vegetationsgruppierung</b>	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_04_kollin.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_04_kollin.pdf</a>
	<b>Zugehörige Kartierobjekte</b>	9952 (kRi), 10016, 7912 (Ri), 7908 (Ri)

**Impressum**



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg  
 Abt. Waldnaturschutz  
 Wonnhaldestr. 4  
 79100 Freiburg  
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

**Datenquelle:**

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

**Technische Realisierung:**

IDaMa GmbH, Freiburg [www.idama.de](http://www.idama.de)