

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Baar-Wutach

Regionale Einheit

5/04 Untere Wutach und südöstlicher Hotzenwald

Standortskundliche Höhenstufe

kollin

Höhenverbreitung (Wald)

430 (297 bis 616) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

9 Ø Temp. / Jahr [°C]


15,7 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

1108 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

451 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

kTL



h'braun

d'braune Querstriche

Buchenwald auf mäßig frischem Tonlehm

Standortskundliche Wasserhaushaltsstufe:

Mäßig frisch bis grundfrisch

in der


Öko-Serie der nicht vernässenden Tonlehme

(Mittel- bis tiefgründige, tonige Lehme bis lehmige Tone aus Verwitterung des Muschelkalks, sowie des Keupers und Lias; meist tiefgründig entkalkt, steinarm, ± durchlässig; häufig mit lockerem, schluffig-lehmiger Oberboden um 25 cm, bis 40/50 cm möglich)

Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der ebenen und schwach geneigten Lagen Flachlagen
	Bodentyp	Terra fusca-Parabraunerde
	Humusform	Mull
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Asarum europaeum-, Milium effusum-, Ajuga reptans-, Rubus-, (Mercurialis perennis-, Stachys sylvatica-, Urtica dioica) - Gruppe
	Aufnahmen	1 Vegetationsaufnahme (2006)
	Natürliche Waldgesellschaft	Waldgersten-Buchenwald; stellenweise Waldmeister-Buchenwald (typisch)
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche
	Nebenbaumart(en)	Bergahorn, Bergulme, Gemeine Esche, Hainbuche (Weißbuche), Sommerlinde, Spitzahorn
	Pionierbaumart(en)	Elsbeere, Feldahorn, Salweide, Sandbirke (Hängebirke), Stieleiche, Traubeneiche, Vogelbeere (Eberesche), Vogelkirsche

		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
Baumarteneignung	geeignet (g)	Es	1	2	1	1
		RBu	1	2	1	1
	geeignet bis möglich (g/m)	Dgl	2	2	1	1
		TrEi	2	2	1	1
	möglich (m)	BAh	2	2	2	1
	wenig geeignet (w)	Ta	3	2	2	2
		Fi	2	2	3	2
	wenig- bis ungeeignet (w/u)	Kie	3	3	2	3
	sonstige Laubbaumarten	BUI, Elsbe, FAh, HBu, SaBi, SWei, VKir				
	sonstige Nadelbaumarten	ELä				
Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	6,8 ha				
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	gelegentlich/zerstreut (0,5 %)				
	Kartierzeitraum	2000-09	-	88,6 %		
		1970-79	-	11,4 %		
Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_04_kollin.pdf				
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_04_kollin.pdf				
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_04_kollin.pdf				
	Zugehörige Kartierobjekte	9952, 7908 (TL)				

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de