

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Baar-Wutach

Regionale Einheit

5/04 Untere Wutach und südöstlicher Hotzenwald

Standortskundliche Höhenstufe

submontan

Höhenverbreitung (Wald)

583 (385 bis 813) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

7,9 Ø Temp. / Jahr [°C]

14,5 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


1089 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

451 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

BIH

Buchen-Bergahorn-Wald auf mäßig frischem Block- und Felshang



d'gelb

h'grüne Schräggitter

schwarze Dreiecke leer und ausgefüllt

Standortskundliche Wasserhaushaltsstufe:

Mäßig frisch bis hangfrisch

in der

Gruppe der Block- und Felshänge

(Felspartien mit +/- groben Blockschuttdecken (i.D. Blöcke mit mehr als 20 cm Durchmesser) im Grundgebirge (Granit und Gneis); meist steil bis schroff; fließende Übergänge zu den Steinschutthängen; meistens Bestockung lückiger)


| | | |
|------------------------------------|------------------------------------|---|
| Morphologie und Boden | Morphologische Beschreibung | Standortseinheiten der Hänge meist steile bis schroffe Hanglagen wechselnder Exposition |
| | Bodentyp | Ranker bis Braunerde |
| | Humusform | Mull bis Moder, selten Rohhumus |
| | Basenausstattung | keine Eingabe |
| | Podsoligkeit | ohne Podsoligkeitsmerkmale |
| | Rutschgefährdung | Keine Rutschgefährdung |
| Vegetation | Ökologische Artengruppen | Deschampsia flexuosa-, Vaccinium-, Ajuga reptans-, (Miliun effusum) - Gruppe |
| | Aufnahmen | keine Vegetationsaufnahmen |
| | Natürliche Waldgesellschaft | Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne; Drahtschmielen-Bergahorn-Blockwald |
| Baumarten des Standortswald | Hauptbaumart(en) | Rotbuche, Bergahorn |
| | Nebenbaumart(en) | Traubeneiche, Weißtanne |
| | Pionierbaumart(en) | Sandbirke (Hängebirke), Vogelbeere (Eberesche) |

| Baumarteneignung | Konkurrenzkraft Pfléglichkeit Sicherheit Leistung | | | | | |
|-------------------------|---|----------------------------------|---|---|---|---|
| | geeignet bis möglich (g/m) | BAh | 1 | 2 | 1 | 2 |
| | | RBu | 1 | 2 | 1 | 2 |
| | | Ta | 1 | 2 | 1 | 2 |
| | möglich (m) | Dgl | 2 | 2 | 1 | 2 |
| | | TrEi | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | möglich bis wenig geeignet (m/w) | Kie | 2 | 3 | 1 | 2 |
| | wenig geeignet (w) | Fi | 2 | 3 | 2 | 2 |
| | sonstige Laubbaumarten | Aspe, HBu, SaBi, SWei, Vobe, WLi | | | | |
| sonstige Nadelbaumarten | - | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|--|---------------------------------|------|--------|--|
| Vorkommen | Fläche der Standortseinheit | 45,4 ha | | | |
| | Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende | gelegentlich/zerstreut (0,45 %) | | | |
| | Kartierzeitraum | 2010-19 | - | 39,2 % | |
| | | 2000-09 | - | 4,8 % | |
| 1970-79 | | - | 56 % | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|---|--|--|--|
| Organisatorisch | Link zur Regionallegende | https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_04_submontan.pdf | | | |
| | Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung | https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_04_submontan.pdf | | | |
| | Link zur Vegetationsgruppierung | https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_04_submontan.pdf | | | |
| | Zugehörige Kartierobjekte | 7912, 10016, 10026, 9952 | | | |

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de